

長野県
埋蔵文化財
センター
紀要 3

1989

- 土器にみる森将军塚古墳出現の前後…………青木一男 (1)
——千曲川中流域の研究と今後の課題——
- 古代水田跡調査の実践と問題点…………河西克造 (14)
- 遺跡の整理におけるコンピューター
利用について…………小林秀行 (26)
——下茂内遺跡での実践例から—— 近藤尚義
- 石川条里遺跡における
珪藻化石を通しての…………越川長治 (36)
古環境復元の試み

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 長 | 野 | 県 | | |
| 埋 | 蔵 | 文 | 化 | 財 |
| セ | ン | タ | 一 | |
| 紀 | 要 | | 3 | |

1989

- 土器にみる森将軍塚古墳出現の前後…………青木一男 (1)
—千曲川中流域の研究と今後の課題—
- 古代水田跡調査の実践と問題点…………河西克造 (10)
- 遺跡の整理におけるコンピューター
利用について……………小林秀行 (44)
—下茂内遺跡での実践例から— 近藤尚義
- 石川条里遺跡における
珪藻化石を通しての……………越川長治 (44)
古環境復元の試み

財 団 法 人

長野県埋蔵文化財センター

序

(附) 長野県埋蔵文化財センターも、昭和57年発足以来、8年目を迎えました。本年度は、長野自動車道建設にかかる調査が、松木平における遺跡の整理作業と報告書の刊行が完了の運びになるとともに、上信越自動車道建設にかかる調査では、佐久市内遺跡の整理作業と善光寺平における発掘調査が本格化してきております。

当センターとしましては、年々増大する発掘調査事務量に対処するため、組織・機械の整備・拡充をはかり、事業の円滑な推進をめざして綱意努力してまいりました。

一方、このような情勢のもとで考古学をはじめとする関連諸学の学間水準の向上には飛躍的なものがあり、埋蔵文化財の発掘調査においても、その学術性の維持と向上が今まで以上に求められてきているのも事実であります。

職員の研修については、奈良国立文化財研究所その他関係機関での研修や関係団体の研究会等でその機会を得、充実をはかってきているところですが、自己研鑽もまた日々努めなければなりません。

ここに、日頃の研究・研修成果や発掘調査に直接かかわる実践報告を収録した「紀要」第3号を発刊することになりました。この「紀要」が、今後の調査研究活動の一助になるものと確信しております。

本書の刊行に際し、関係機関から寄せられました御協力・御援助に対しお礼申し上げるとともに、今後の御叱正・御教諭を切にお願いする次第です。

平成2年3月20日

財團法人長野県埋蔵文化財センター

理事長 植口太郎

土器にみる森将军塚古墳出現の前後

—千曲川中流域の研究と今後の課題—

青木 一男

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| I. はじめに | 1. 在来系と外來系甕の共伴 |
| II. 千曲川中流域の土器様相 | 2. 御鳳巣式土器の背景 |
| 1. 段階仮説 | IV. 森将军塚古墳出現期の土器様相と諸問題 |
| 2. 甕にみられる諸様相 | 1. 森将军塚古墳の土器 |
| III. 森将军塚古墳出現前夜の土器に関する諸問題 | 2. 森将军塚古墳出現期の集落土器 |
| | V. 今後の課題 |

I. はじめに

森将军塚古墳の史蹟整備にともなう調査・復元整備が開始されて10年になる。古墳はむろんのこと墳丘をのせる尾根全体を調査するなかで、東日本の古墳時代研究にとって様々なデータを与えてくれたことは言うまでもない。一方、東山道ルートの千曲川流域の古墳出現期を考える観点を示してきた。

今日、現代の東山道から北陸道へ向かうとする中央自動車道長野線・上信越自動車道が森将军塚古墳の脚下、善光寺平南城で急ピッチで進められている。ここ2年、かつて予想の城をこえるものではなかった弥生時代の環濠集落、弥生時代から古墳時代の水田生産地、祭祀跡等、善光寺平南城の古墳出現期を考えるために重要な調査が行われてきている。かつて森将军塚古墳の調査にかかわり、今日、高速道路建設にともなう遺跡保護にかかわる者として、千曲川中流域の古墳出現期の土器について、これまで調査の中で考えたことを仮説として示し、今後の課題と展望を考えてみたい。

II. 千曲川中流域の土器様相

千曲川流域の弥生時代後期から古墳時代前期の土器潮流・様相の把握について、近年、各氏がそれぞれの成果を発表している。

千野治氏は千曲川流域の弥生後期を扱い、甕の型式変遷を基軸に5段階大別案を示し、箱清水様式の終末も予察した。(千野 1989)

善沢浩氏は、弥生系土器・外來系土器の動向をもとに信濃の古墳時代前期を2時期4段階に編年を行い、1期に北陸・東海系土器が、2期に布留式土器の影響を受けた土器が、在来の土器に影響を与えたことを示唆した。(善沢 1988)

宇賀神誠司氏は、小型精製土器群の消長と伴するS字状口縁合付甕(以下S字甕と略す。)の型式に主眼をおき信濃の古墳時代前期を2期に大別、4段階の小期に区分した。氏は、北から南へと長い信濃の小盆地を4地域に分け、1期段階における外部勢力による影響には北と南ではそのルート・質に違いがあったらしいこと、2期段階においては畿内色の顕在化が見られることを示唆した。(宇賀神 1988)

かつて青木も、善光寺平南部の弥生時代末から古墳時代前期を3期に区分したことがあったが両期の位置づけ等、不十分な点があった。(青木 1986)

今日、資料的には十分とは言い難いながらも大筋の流れは一致してきているように見える。弥生時代後期から古墳時代前期の千曲川中流域の土器を、在地色を示す土器形式の消長と変質、外來系土器の出現・定着、変容を考慮しながら大枠の4段階仮説を示す。

1. 段階仮説

〈四ツ屋30号住設跡〉(第2図・第3図15~16)

弥生時代後期後半、箱清水様式の後半ないしは終末段階としてとらえる。中部高地型櫛捲文の施文技法は箱清水様式の中でとらえられる。日本海



第1図 千曲川中流域の遺跡分布

側から縫入されたり、影響を受けた甕(16)、甕(15)が伴う可能性が高い。中野市安源寺遺跡では同段階にともなうと考えられる北陸系高环が出土している。同段階の外來系土器は四ツ屋遺跡出土の甕(15)、象山口遺跡出土の甕(16)の胎土は在来のものと異り、搬入品かと考える。外來系土器は必ずしも多くないものの、若干の北陸系土器の甕、甕、漁塙が搬入、模倣されていると考える。東海系土器は現状ではみられない。今後出土したとしても北陸系土器に比べ比叡が低いであろう。藤ノ井遺跡群・空川堤防地点6号方形周溝墓を同段階としてとらえる。

<四ツ屋9号住段階>(第3図17~26)

当段階は様相的に区分されると考えられるが、中部高地型彌縫文系とともに、北陸系・東海系土器が共存したり、中部高地型彌縫文系のプロポーション・施文技法に変化が顕著に見られるようになる段階としてまとめて考える。小型積製土器群の小壁高环、小型器台が出現する。御庭敷4号住、牛込バイパスA1・2号住、四ツ屋24住、清13を同段階としてとらえる。

<灰塚1号住段階>(第4図)




中部高地型彌縫文の施文が見られなくなり、甕は平底のハケ甕が主体を占める。中部高地型彌縫文の系統を引き、側部外面にヘラミカキを施すものの(42・43)もある。箱彌縫文タイプの高环に変って脚部がハの字状に開くタイプ(37)の高环が主体になるとを考える。この段階に小型積製土器群の小壁丸底土器、有段口縁を有する鉢が出現する。

<藤ノ井遺跡群・空川堤防段階>(第5図)

弥生時代後期以来の伝統である中部高地型彌縫文系の土器が見られなくなり、畿内の影響を受けた脚部の柱状のひびき高环(46~49・67~71)が出現し、前段階から出現したハケ甕が対応・盛行することによって特色づけられる。前段階にみられた北陸系・東海系土器がかけをひそめる。粗製の小壁器台・小壁丸底土器(62~64)が盛行する。四ツ屋遺跡新村氏採石資料、塙塔IV、9・14号住を同段階としてとらえる。


2. 瓢にみられる諸様相

千曲川流域の弥生時代後期の甕は中部高地型彌縫文を施文する平底甕を主体とする。これは古墳時代前期においても変わりない。前期前半においては中部高地型彌縫文を施文する甕の割合が高




第2図 四ツ屋30号住段階

1~8 四ツ屋30号住
9~14 磯ノ井逃跡群型川堤防塗点、6号方形知溝墓



第3図 四ツ屋30号住段階・四ツ屋9号住段階


15~19 山口、17~25 四ツ屋9号住
0 5 10cm



第4図 灰塚段階


灰塚：奇佳 27~45

0 5 10cm



第5図 祐ノ井目転車道段階

46~57 祐ノ井遺跡第一大規模自転車道地点
58~66 四ツ塗
67~82 猿将軍原古墳



第6図 瓢形土器の実態

| 変遷段階 | 中部高地系 | | 北 識 系 | | 東 海 系 | | 平底ハケ窯 |
|-----------|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|
| | 彌描文 | ハ ケ | 法仏系 | くの字系 | S字窯 | 台付窯 | |
| 四ツ屋30住以前 | ◎ | | + | | | | |
| 四ツ屋30住段階 | ◎ | △ | △ | + | + | | |
| 四ツ屋9住段階 | ○ | ○ | | ◎ | ○ | ○ | + |
| 灰 塚 1住段階 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 糸ノ井自転車道段階 | | + | | + | △ | | ◎ |

◎多くみられる ○みられる △少しがみられる +可能性あり

第1表 变形土器の段階変遷

い。ところが、この時代の窯の中には、北と南から影響によって中部高地型彌描文系の窯に変化が見られたりする。また、平底窯の中に台付窯も出現するが主体とはならない。台付窯の出現の背景に太平洋側からの動きが読み取れる。さらに、前期後半になるとハケ調整をした平底窯が主体となる。(第1表)

弥生時代後期末から古墳時代前期の在来で主体となった窯は弥生時代以来の地域的伝統の平底窯であった。大まかにとらえるならば、中部高地型彌描文を施すするタイプから、ハケ調整の度へと変化する。以下、窯の変遷とその様相について私見を記す。

四ツ屋30号住段階は、中部高地型彌描文を施した窯が主体となる。千野浩氏によれば、「窓部最大径を肩上半に有し口縁部は頸部内面に筋を形成してくの字状に鋭く外反する」B類(図版6-83)が出現するという。一つの指標になるであろう。千曲川中流域でも、善光寺平南部に限っては、千野氏がC類とした、最大径を胴中位付近にもち、口縁部が長く発達しないもの(84)に比べ量的に多く見られるのではないか。口縁端部をつまみあげ状にしたり、文様を施さないハケ調整のものが出現するが量的に少なくない。

四ツ屋9号住段階の窯には四ツ屋30号住段階の窯に比べて大きな変化を見い出すことができる。内的には中部高地型彌描文系窯の変容であり、外的には他地域から搬入されたり、模倣の結果と考えられる外來系窯の量的増加である。内的変容には外的要素の影響が考えられる。もちろん、四ツ屋30住段階においても外的影響がなかったわけではないものの、この段階ほど弥生中期後半段階以来の中部高地型彌描文系土器を変容させた段階はないだろう。

中部高地型彌描文系の土器では、千野氏のいうところのB類も見られるが、「窓部が球形化し、口縁部の外反がさらに強くなる」C類およびその変形(88)がめにつく。一方、口縁端部をつまみあげたり、面取りをするもの(90)、彌描文を施さないながらもプロポーションは中部高地型彌描文系のもの(87)も量を増すと考えられるが、史料的制約は大きい。伝統的要素に目を向ければ、千野氏の言うB・C類がみられるものの、将米、この段階において、伝統的要素の量的問題まで言及されるであろう。

外的要素として、前段階にひき続き日本海側との関係をあげることができる。北陸東部系の、口縁端部をつまみあげ状に面取りをおこなうくの字窯(91)が当塗で製作されるのはこの段階の当初からであろう。分布範囲は、小県郡長門町中道遺跡を主張とし、その以北に広く分布する(第2表)。同系列の窯は次段階の灰脈段階以降まで見られるが、平道・琵琶湖・西光母・塙崎・鶴前等、千曲川中流域で中部高地型彌描文系の窯と共伴する。新潟県と接する下流域では良好な資料がみられないものの、この段階の千曲川中流域以北に、日本海側からの強いインパクトがあったことは確実であろう。

さらに、この段階には東海系のS次窯がやはり当地で製作される。御里敷遺跡4号住では、赤塚分類B類に伴行すると考えられるS字窯(92)が中部高地型彌描文系窯と共伴する。上田市国分寺遺跡僧房下層・長野市四ツ屋遺跡17号住・中野市安源寺遺跡等にもみられる。この段階の千曲川中流域は北からも南からも何かしらのインパクトを受けていることになるだろう。

灰脈段階においては、中部高地型彌描文系の窯に変ってハケ調整を施す平底窯(95)が主体になる

ものの、中部高地型櫛描文系の伝統が溶けてしまふわけではない。器形的には千野氏のいうB類・C類系の系譜をひくものがみられる。また、ハケ甕の中に胴部外面下半にヘラミガキを加えるもの(93)が見られるが、これも在米の伝統が生きていることになる。しかしながら、この段階、櫛描波状文・藤状文等の文様埴文は急激にみられなくなり、甕の外面はハケ調整のみとなる傾向にある。外的影響の中で、中部高地型櫛描文の文様埴文に意味がなくなったということになろうか。外的影響の中で内的な選択が働いた結果と考えたい。しかしながら、胴部下半をヘラミガキするという行為は、機能的な選択の結果、伝統的要素として残る結果となつた。

またこの段階、ハケ調整の台付甕(94)、東海西部の赤楓C類と併行すると考えられるS字甕(98・99)が広く分布する。諫訪・松本方面の当段階のS字甕についてはすでに宇賀神城司氏が、甲府盆地、駿河地域との関連を言及しているが、千曲川流域においても、しばしば、東海東部系と考えられる土器と共にすることから、当段階のS字甕のルートは、東海東部→諫訪・松本・佐久→善光寺平→上越といった方向を考えても良いかもしれない。

日本海側からの働きとしては、前段階にひき続きた、口縁端部に面取りを行う平底ハケ甕(96・97)がみられるものの、面取りを行わないものの量も増す。中部高地型系の甕の変容、ハケ調整の平底甕出現の背景にはこれらの東海地方の台付ハケ甕、北陸地方の平底くの字ハケ甕が深くかかわって

いるように考えられる。

篠ノ井自転車道段階の甕は、ハケ調整の平底甕が主体となる。腹外縁下半にヘラミガキを施すものは量的に減少する。S字甕は若干見られるが、体部外縁のヘラ削り痕を残すもの(51)もあり、退化傾向を示す。系譜的に日本海側のものとみられる平底ハケ甕もみられる。

III. 森将軍塚古墳出現前夜の土器に関する諸問題

森将軍塚古墳出土の土器のなかで石室内出土の小型丸底土器(74)を布留式古段階併行の系譜と考えると、四ツ屋30号生段階、四ツ屋9号生段階は、森将軍塚古墳出現前夜ということになろうかと考える。当段階は日本海・太平洋側からの影響があるであろうという仮説は前述した。当段階の外来系土器に關する若干の問題を考えたい。

I. 在衆系と外来系土器の共存

南北に長い信濃の国は、その中心の諫訪盆地付近を分水嶺として、前の天竜川水系の水は太平洋側に、北の千曲川・犀川水系の水は日本海側に注ぐ。また「山の道」東山道は天竜川水系の伊那谷を通り上し、諫訪・松本・佐久盆地を通り、上野の国へと抜ける。千曲川中流域は、東山道から日本海側に抜ける場合、重要な地点と成り得る立地条件となる。

弥生時代中期以来、当地域と日本海側は密接な関係を保っていたものの、太平洋側との関係はさほど強いとはいえない。天竜川流域が太平洋側と密接な関係を持っていたこととは対照的である。

| 遺跡名 | 遺構名 | 櫛描文系 | S字甕 | 本種系 | 段階 |
|-----|-------|------|-----|-----|----|
| 中道 | 3住 | ○ | | ○ | |
| | 11住 | ○ | ○ | ○ | |
| 琵琶塚 | 13住 | | ○ | ○ | 仄軍 |
| | 15住 | ○ | ○ | ○ | |
| 西光房 | 8住 | ○ | ○ | | |
| | 4住 | | ○ | ○ | |
| 圓分寺 | 僧房下層 | ○ | ○ | | |
| 四ツ屋 | (17住) | ○ | ○ | | |
| 小島塚 | 6住 | | ○ | ○ | 仄軍 |
| 御屋敷 | 4住 | ○ | ○ | | |

第2表 住居址出土・變形土器の共存関係

しかしながら、四ツ星9号住居階になると日本海側系の土器とともに、太平洋側系の土器が見られるようになる。東海地方西部系のS字甕、小型高环が出現するのも当段階であろう。

表2のように、東海系のS字甕、北陸系の甕、中部高地型横描文の甕が住居址の埋土中とともに出土するのはこの段階が顯著である。北陸系、中部高地系甕とともに出土するS字甕はいずれも赤堀次郎氏が分類する東海西部A系統B類に併行する段階のものと考えられる。従来、これらの資料は破片資料が多かったり、古墳出現期の外來系土器群が注意される以前の調査例もあり、中部高地型横描文系と外來系が分離されてきた傾向がある。住居址のピット内から一括出土したという御屋敷4号住の完形のS字甕、中部高地型横描文の甕の共伴例をのぞき良好な資料は少ないといえる。しかし、破片資料ながらも、長門町中道3号住においては、床面密着と報告された土器群においても、覆土層と報告された土器群においても北陸系と中部高地系の土器が混在している。中部高地系と外來系が混在した場合、発掘調査の過程でその意味を統計しなければならないであろう。住居址の土層によって出土土器群を区別する場合、施釉あるいは施窯の時間差、意味の違いを土器觀察の所見とともに示さなくてはならないであろう。中道3号住の場合、床面密着土器群も覆土層中の土器群も施釉された瞬間ににおいては一括のものであると考える。

資料的制約の中、仮説が先立ちするものの、当段階において、中部高地型横描文系の甕と、北陸系くの字甕・東海系S字甕がしばしば共伴する事実を重視したい。

2. 御屋敷式土器の背景

かつて、森島鶴氏は、赤坂B類併行の古式のS字甕と中部高地型横描文の甕が共伴した御屋敷4号住の一括資料をもって「御屋敷式土器」と呼び、弥生時代最終末の土器群としてとらえた。森島氏は、S字甕が中部高地型横描文と共伴する事実を考察し、「諫忌平野からの指向であるS字状口縁台付甕が侵入することによって箱清水式II式土器である土着の土器はにわかに変容してきたものと把握される」「いわばそれは箱清水式土器文化の解体を意味している」と説明した。しかしな

がら、「S字状口縁台付甕の侵入」とは何か、「箱清水式土器文化の解体」とは何か、十分な説明がなされたとは言い難い。森島氏の説る、当段階の「侵入」「横描文系の解体」について考えてみたい。

まず、外來系土器には搬入土器、横置土器、折衷土器をあげるが、この段階、肉眼観察からすると搬入土器はむしろ少なく、横置土器が多いのではないか。胎土分析、数量の検討をしていないので明らかなことは言えないが、御屋敷4号住のS字甕も肉眼観察からすれば他の中部高地型横描文系の土器群と同様上であり、在地で製作された模倣器であろう。模倣土器の製作者の問題もある。模倣行為の背景には、在地の人間が搬入された土器を模倣する立場と、他の地域から移動した人間が、移動前の地域の土器を製作する立場がある。御屋敷4号住の場合、中部高地系横描文系の土器を使う在地の人間が当地域に搬入されたS字甕を模倣したのだろう。在地の人間が他の地域の土器を模倣する背景には、模倣する土器に対する在地の選択があったと考える。

御屋敷4号住資料は、住居址内ピットから一括出土したといい完形土器5点のセットである。箱清水式系の甕、甕、高环とともに埋置されたS字甕は在地の人間にとて必要とされた形であったのであろう。完形の箱清水式系の上器と外來系の土器が住居址内から一括出土した例としては四ツ星9号住例もある。東海系土器に加えて、犬伏川文化調と千曲川文化圏の接点と考えられる頭防方面の盃も含まれていたが、いずれも肉眼の観察によれば在地で製作されていると考えられ、しかも、同作居址からはト骨、銅製指輪が出土している。模倣と考える外來系土器群の箱清水式系との一括埋置を考える場合の糸口となるであろう。

御屋敷、四ツ星例で他の地域の土器を模倣しつつ、在地の人間が製作したと考えた外來系土器に甕、甕が見られた。この背景には、他の地域の人間の移動とその交渉の結果、在来の精神的な行為、祭祀的行為のモデルも変容し、土器群にも表象されているものと考えたい。

一方、在地で製作されたと考える模倣土器の中でも、他の地域から移動した人間が移動前の地の土器を当地で製作していると考えられるものも見ら

れる。中道3・11号住は玉作りを行なっていた住居址であったがそこから出土した甕・壺・小型精製土器の系譜は北陸東部地方に求められるものであつた。

森島稔氏の言う御屋敷式土器は当段階に当たると考えるが、外来系土器が千曲川中流域で製作される場合、搬入された土器の形、情報を模倣して在地の人間が製作する場合と、移動した人間が彼の地の土器を製作する場合を示した。御屋敷式土器における侵入の背景には、千曲川中流域にそういった現象を起こさせる他地域からの強いインパクトが働いたのであろう。船津式土器の解体とは、当地域の精神的モデルの変化であり、文化的、経済的インパクトは無論のこと、東日本的な世界で受けた政治的インパクトが強く関わる中で起きた現象とみた。その時代の土器が御屋敷式土器なのであろう。

IV. 森将軍塚古墳出現期の土器様相と諸問題

四ツ屋9号住段階の集落土器には他地域からの強いインパクトがあることを読みとり、御屋敷式土器の問題点についても考えた。外来系土器として小型精製土器群の一部が出現する段階であるが、小型丸底土器は出現していない。この段階、森将軍塚古墳出現への政治的なインパクトはすでに始まっていたのだろう。次に、森将軍塚古墳が出現するであろう灰塚段階の集落と墳墓の土器様相について考えてみたい。

1. 森将軍塚古墳の土器

千曲川中流域の聖光寺平は信濃でも古式前方後円墳が集中する地域である。とりわけ古式とされる森将軍塚古墳は昭和54年度より墳丘の全面調査が進み、墳墓祭祀の土器を若干ながら出土している。

出土地点は後円部墳頂部と、墳麓部に大きく区分される。後円部墳頂部は底量なる盪掘により情況は明確ではないが、堅穴式石室内から何片かの小型丸底土器片が出土している。本来の位置は必ずしも明確ではないが、後円部での墓前祭祀と時間的にさほどずれがないであろう。この土器に対し、岩崎卓也氏は布留式古墳陪併行期の所産と考え、都出比呂志氏は「布留式中段階でもおかしく

ないと述べられた」と岩崎氏が記されている。岩崎氏の考え方をとれば灰塚段階に並行し、郡山氏の考え方をとれば籠ノ井自転車道段階ということになる。

墳墓出土の土器の中には4世紀から6世紀に及ぶ小型埋葬施設に伴うもの、小型埋葬施設とは結び付かないものが見られる。昭和56年の篠岡郡北東部に継ぐ尾根上の調査では、後円部から北東尾根にかけてブリッジ状の張り出しが確認され、ブリッジから南東方向の斜面に、底部に5~10ミリほどの穿孔を有する小型丸底土器、高杯、小型壺とともに小堀器台(第5図)が出土した。高杯(図5-67~70)は脚部が柱状にのびる布留式系の高杯で、小型壺台は精製されないものである。これらの土器を報告した青木は、この地点、土器群が祭祀に関わるものであろうと考えた。祭祀であるとすればいつの段階のものであるかが問題であるが、籠ノ井自転車道段階に森将軍塚古墳墳蓋で穿孔土器群が使用された事実を記しておきたい。また、墳墓出土の土器の中には北陸系くの字甕もみられる。形態からは籠ノ井自転車道段階より一段階古い灰塚段階と考えたいがいかがなものであろうか。時間的問題もさることながら、森将軍塚古墳に北陸系の土器もみられるることは重視したい。諸集団との関係の中で成立した背景が読み取れるかもしれないからである。

2. 森将軍塚古墳出現期の集落土器

森将軍塚古墳の土器をみるとかぎり、最も古い土器群は灰塚段階から籠ノ井自転車道段階に当たると考えられる。そうであるならば、四ツ屋9号住段階は森将軍塚古墳造営以前ということになる。森将軍塚古墳造営前夜に太平洋側からも日本海側からもインパクトがあり、在来の集落の土器にも変化があらわれるということになるであろう。在来土器群の変化、外来系土器の模倣、小型精製土器群の出現の背景に、精神的モデルの変化を促した政治的インパクトを考えたが、この現象は森将軍塚古墳造営以前から既に始まっていた。

森将軍塚古墳が出現するであろう灰塚段階の後半には、布留式系甕の例は少ないながらも、ハケ調整の平底甕に変化する。同時に東海系S字甕が広範囲に定着し、東海西部地域とは若干異なる変化も示す。この段階のS字甕は、甲府盆地のS

字彙と強く類似性を示す茅野市下蟹河原、松本市石行、佐久市腰巻とはほぼ同型式であり、灰原段階の外来系土器群のインパクトが、東海、甲府盆地、東山道経路で善光寺平中流域に与えられたことが予想される。森村軍塚古墳が構築された善光寺平南城は後々の歴史が語るように生産性の高い土地柄であるとともに、北と南の結点であり、交通の要所であった。千曲川流域への政治的働きかけは、まずこういった土地に与えられ、北陸と東海、さらには東山道の分岐点として善光寺平南城・千曲川中流域が重視されたのかもしれない。

V. 今後の課題

森村軍塚古墳出現期の善光寺平南城、千曲川中流域の土器様相について、在来系・外来系土器の動向とその背景等、仮説・検証を行ってきた。上器群の型式組列の検証・模式論的検討を十分に加えておらず、仮説が先行するかたちとなってしまったが、今後の課題を記して研究ノートのまとめとしたい。

弥生時代後期の上器罐年作業の前段階として、器種ごとの型式変遷の検討が青木和明氏、千野浩氏等によって行われている。從来の信濃の古墳出現期の土器研究は、外来系土器の出現に、弥生社会変化の糸口を見い出し、社会の変化を予察してきた。東海系のS字型、越後系とされた面とりつまみ上げをおこなうくの字平底壺、小型精製土器群等が注意されている。その方向の是非はともかくとして、同土器群とともに共伴するむしろ主体的な中部高地型柳垂文系土器群の型式変化とその背景、地域性については十分ふれられてきたとは言いがたい。古墳時代の中部高地型柳垂文系の土器群の検討が必要であろう。

外来系土器群については宇賀神誠司氏が、その

背景について検討し、信濃に対する政治的動向を分析している。信濃の各地域において基礎的な編年作業を行ってからの考察であり説得力がある。今後、開拓的とされる弥生時代中期末から後期段階の他地域との関係を土器の上から考える必要があろう。天竜川流域の善光寺平南城の調査・研究はすでに山下誠一氏が行われていると聞く。千曲川流域の信濃水文化圏においても必要であると考える。

外来系土器については、調査時の共伴土器の検討も課題である。特に、破片資料の場合、出土状況の記録、検討は十分に慎重であらねばならない。混入と判断されても、図化、写真、文章等によってその情況を調査者以外にも明確にすべきである。製作地の問題も、詳細な胎土の観察、化学的な分析が加えられる必要がある。川村浩氏が新潟県出土の布留甕、S字型の胎土分析結果を明らかにした(川村1989年)ように胎土分析資料を積み重ねていく必要があろう。

信濃の小地域毎の在来の土器群の型式変化とその組みあわせを様式的にとらえた編年作業。さらに、他地域とのかかわりの中で出現する器種の出現とその変化を検証する作業の中から、信濃の古墳出現期社会の一端が復元されるものと考える。非力ながら努力していくつもりである。

なお、本レポート作成以前に、新潟考古学研究会例会において、長野市立博物館・前島卓氏と千曲川中流域の弥生時代終末から古墳時代前期の土器罐年案を発表させていただく機会があった。本レポートの考證の中には前島氏から御教授されたことも多々ある。前島氏および、坂井秀弥氏、川村浩氏、品田高志氏はじめ新潟考古学研究会諸氏に感謝申し上げます。

引用参考文献

- 青木和明 1984「信濃水式土器の罐年子案——千曲川流域弥生土器における高環形土器を中心として」『長野県考古学年譜』48
- 青木和明 1985「IV土器、まとめ」『浅川肩状地遺跡群——車札バイパスA・E地点遺跡——』長野市教育委員会
- 青木和明 1984「猪ノ井透跡群善光寺平防地點・小島施遺跡」「第5回三県シンポジウム 古墳出現期の地域性」千曲川水系古代文化研究所発
- 青木一男 1984「善光寺平南城における古墳出現期集落土器について」『第5回三県シンポジウム古墳出現期

の地域性』千曲川水系古代文化研究所他

- 森 崑 次 郎 1986 「S字縫について」『久山式土器とその前後』第3回東海埋蔵文化財研究会
- 岩 崎 卓 也 1971 「まとめ」「下条・灰塚」更埴市教育委員会
- 岩 崎 幸 也 1973 「長野県農耕草塚古墳」更埴市教育委員会
- 岩 崎 卓 也 1975 「古墳と地域社会」「日本考古学を学ぶ(3)」有斐閣
- 岩 崎 卓 也 1984 「古墳出現期の一考察」「中部高地の考古学」Ⅲ 長野県考古学会
- 岩崎卓也、森嶋裕、矢島宏雄他 1984 「森将軍塚古墳—保存整備事業第4年次実施調査概報—」更埴市教育委員会
- 宇賀神 誠 司 1988 「古墳時代初期の土器について」『松本市赤木山遺跡群Ⅱ』松本市教育委員会
- 宇賀神 誠 司 1987 「在来系土器群の構造」「牛央自効率道長野線埋蔵文化財発掘調査報告書2」長野県埋蔵文化財センター
- 宇賀神 誠 司 1988 「長野県における古墳時代前期の地域的動向」『長野県埋蔵文化財センター紀要2』長野県埋蔵文化財センター
- 上田市教育委員会 1987 「琵琶塚遺跡」
- 加 納 俊 介 1986 「総論」「穴山式土器とその前後」第3回東海埋蔵文化財研究会
- 桐 原 健 1980 「信濃国開拓交流についての考古学的所見」「信濃」32-12
- 後 沢 浩 1988 「4 古代の上器」「長野県史 寺古資料編」全一巻道場・造物
- 子 野 浩 1989 「千曲川水系における後期房生式土器の変遷」「信濃」41-4
- 長門町教育委員会 1987 「中道」
- 長野市教育委員会 1987 「四ツ屋・諒間・堀崎IV」
- 長野市教育委員会 1987 「篠ノ井遺跡群—大窓撰自転車道遺跡—」
- 花 田 弘 1986 「土師器の成立と古墳時代」「歴史手帖」2
- 藤 井 みどり 1987 「元那岐式土器の再検討」「南山考古2」
- 坂 井 秀 弥 1984 「新潟県外出土の北陸東部系の土器」「第5回三県シンポジウム古墳出現期の流域性」
- 川 村 宗 司 1988 「新潟県福島遺跡出土の外系土器群3例」「歴尚考古学談話会報1号」
- 森 塉 稔 他 1978 「更埴、埴科地方誌」第2巻 原始・古代・中世編
- 山 下 誠 一 1986 「V土器の誕生」「恒川遺跡群」飯田市教育委員会
- 長野県埋蔵文化財センター 「埋蔵文化財ニュース」
- 伊 藤 友 久 1988 「鶴前遺跡」「長野県埋蔵文化財センター年報5」
- 三上徹也・白眉直之 1988 「石川豪里遺跡」「長野県埋蔵文化財センター年報5」
- 西 山 克 己 1988 「篠ノ井遺跡群」「長野県埋蔵文化財センター年報5」

古代水田跡調査の実践と問題点

河西 克造

I. はじめに

II. 川田条里遺跡の概要

1. 調査の経過と成果の概要

2. 水田の構造と畦畔による区分

3. 川田条里の水田景観

III. 「第2回 東日本の水田跡を考える会」に

参加して

1. 富沢道跡（第35次調査）の見学

2. 中在家南遺跡出土の木製品

3. 各地の調査報告・討論

IV. 調査上の問題点

1. 斜面から平面向へ

2. 水田面と畦畔の検出

3. 面的調査に求めること

V. まとめと課題

I. はじめに

昭和48年に群馬県で「埋没水田」の存在が確認されてから今日に至るまで、全国各地で水田跡の調査が実施された。周知のことく群馬県下では浅間山・榛名山噴出の火山灰層の堆積地で、水田遺構が良好な埋没状態にあったことにより特に発見例が多く、大きな成果をあげている（註1）。

ここで長野県下における水田跡の調査例をみると、比較的小規模で断片的な調査は実施されているものの、未だ全国の事例と比較できる程の資料の蓄積は無いに等しい。かかる状況の中で勤長野県埋蔵文化財センター（以下、当センターと略す）では現在、北信の磐光寺平において石川条里・川田条里の2遺跡で埋没水田の調査を行っており、各々成果があがっている（註2）。

私は昨年（平成元年度）6月より川田条里遺跡で本格的な水田跡の調査に従事することとなり、今年度も難越して調査を行っている。ここで水田跡調査について若干回顧的なことを記すと、昭和61年度に松本平の豊内地盤に位置する老中遺跡で初めて水田跡の調査を経験した。当時は初めて経験する水田跡の調査ということで調査の方向性がよくつかめなかつたが、調査ではトレーンの断面で水田土壤・畦畔等を確認する判断力（知識）の必要性を痛感し、香野一郎・八賀晋・松井健氏の論文、『月刊・文化財』水田跡集号等を中心に土壤学的見地による水田跡のあり方を捉えた文献

に目を通した。その結果、北中遺跡の北端部（E地区）で面的調査により畦畔状の遺構を検出することができた（註3）。

一般的なことではあるが、水田跡の調査方法は、その残存状況により2者に分けられると思う。

第1は、火山灰・洪水等の自然災害により水田が埋没した状況下を調査する方法で、第2は、自然災害が認められず、基本的に下層から上層へ水田が継続している状況の調査法である。前者は所謂「埋没水田」で、前記したように東日本では昭和48年頃群馬県で砾石層下に水田が存在することが確認されたことを契機に、今日に至るまで調査事例が増加している。後者は継続的に水田が營なまれた場合の畦畔調査法である。水田層と水田層の間に自然堆積層が認められず、水田が連続する状況では土層断面での観察時に畦畔を確認することが比較的むずかしい。それは、下層水田層は上層水田の耕作すでに畦畔がこわされている可能性が強いことと、同様な土質・土色を示すため畦畔を認定しづらい。かかる状況（註4）での面的調査では、畦畔の存在を鉄・マンガンによる斑紋・集積層に着目して斑紋の少ない箇所を畦畔と確定する方法を用いる（註5）。


水田跡の調査は、埋没水田が発見される以前には面的調査より断面観察に比重が置かれていた。この代表的な調査例として西山県津島遺跡があげ

られる。

津島遺跡の調査は、土層断面の観察に主眼を置き、水田土壤と地下水位の関係、さらに花粉分析などの調査から水田の性格を把握する方法であった。昭和40年代前半までの水田跡調査は、このような動向であったことに対し、40年後半に埋没水田の発見が契機となってから考古学的な面的調査が水田跡調査の主流を占める動向へと変化した。「而」として水田構造を明らかにすることが可能となり、水田遺跡から得られる情報も多量化した。それは、単に畦畔・水路・杭列の存在とその広がりを捉えるのみならず、水田の立地・各時期ごとの水田の「実態」さらには土地利用と開発の過程を明らかにすることにより、生産域としての歴史的意義づけを可能にしてくれたといえよう。このことは当然のことながら、調査・研究に携わる者が「水田」に対する意識を変える必要があり、調査担当者が水田に「何を求めるか！」によりその遺跡の意義づけも大きく変わるとと思われる。

私にとっては、松本平の北中道跡に始まった水田跡の調査であるが、昨年は川田条里遺跡（A・B地区）の埋没水田で砂層の下から疊断を検出する機会を得、現在も引き続き今までの経験を生かそうとして川田条里遺跡（B地区）の水田跡調査に当っている状況である。

以上、水田跡調査の回顧と埋没水田発見の契機についてを合わせて記したが、昨年・川田条里遺跡で弥生・古墳時代の水田跡を調査した結果、私なりに水田の「姿」についてある種のイメージを抱きつつ、私見を持つに至った。調査の成果については『年報』6を参照されたく、本稿では水田跡調査の実践を披露しながら問題点を挙出していきたい。当初水田跡調査の方向性を示唆する一文を草する考えであったが、未だ水田跡について理解できていない点が多くあり、また川田条里遺跡が調査中でもあることから、それについては別稿を期したい、と考えているため本稿はその序文的



第1図 川田条里遺跡A地区全景

な性格を有すとし、現場での情報（資料）を基に記すことになるので御了承願いたい。なお、本文中で用いた図面・写真は基本的に『年報』で使用したものを利用した（註6）。

II. 川田条里遺跡の概要

1. 調査の経過と成果の概要

川田条里遺跡は、長野市若穂川田地籍に所在する。

この若穂地区の地形は、保科川と赤野田川によって形成された扇状地と、千曲川によって形成された自然堤防とから成っており、本遺跡は自然堤防の背後から扇状地の端部にかけて広がる後背湿地に位置している。若穂地区的歴史的景観について触ると、扇状部には積石塚の長原古墳群が、扇状地をとりまく尾根の先端、頂部には大星古墳群第18号墳を代表とし、東山古墳群・大星山古墳群（註7）など多くの古墳群が確認されている。

また、自然堤防上には弥生時代の集落を形成している町川田遺跡が展開している。このことから若穂の地は、自然堤防上・扇状地上に生活の場や、湿地帯に生産の場がつくられ、それをとりまく尾根上に墓葬が展開していたと考えられる。

今回は、後背湿地のほぼ中央部を横断する形で


上信越自動車道が建設されるため、路線部分に附って調査がされた。調査の便宜上 A～E の地区を設定し、現在でも A・C・D・E 地区において条里型地割（現条里景観）がみられる。A 地区付近では昭和 57 年に圃場整備事業に伴う緊急発掘が長野市教育委員会によって実施され、現地表面下に数枚の埋没水田を確認している（註 8）。

当センターによる調査は、遺跡の調査対象面積が約 10 万 m²と広いこともあり、平成元・2 年度の 2 ヶ年をかけて対象地域の調査を予定しており、平成元年度分については過日報告をした（註 9）。しかし、調査成果については検討すべき点が残されていることと、今年度も調査を継続している関係で、本遺跡の最終的な評価は今年度以降になると思われる。したがって、ここでは過日報告した内容を基に成果を概説してみたい。

調査は、ほぼ全域にトレンチを掘削し、断面観察の結果、更的調査を必要とした A・B₂・C 地区で水田跡の検出に移行した。検出状況を地区ごとにみると、大星山系の山裾から赤野田川までを範囲とした A 地区では、圃場整備事業によつて一部を除き平安時代以降の水田が破壊されていたため、現条里景観と下部遺構との関係を明確に捉えられなかつたが、さらに下層で弥生時代中期～古墳時代後期までの水田跡を 5 箇所検出し、特に弥生時代中期の水田に帰属する水路跡（第 5 図）は注視されよう。一方、県道長野・菅平線から保科川までを範囲とした C 地区では、弥生時代後期～江戸時代までの水田跡を 5 箇所検出し、各水田面は基本的に厚い洪积水砂によって覆われていたため畦畔の残存状況は良好であった。



第 2 図 若穂地区全景



第 3 図 若穂地区の略図

（註 10）。この地区的成果として最も注視されることは、1 地区において弥生時代から現在までの水田区画・構造の変遷を明らかにできた点である。赤野田川と県道長野・菅平線を範囲とした B 地区では、赤野田川等の流路変更により砂礫が厚く堆積している箇所（B₁ 地区）と C 地区と同様な状況で水田が検出される箇所（B₂ 地区）とがあり、後者では数枚の埋没水田が認められている（註 11）。

A～C地区の水田跡は、自然堆積層の厚さに異なりがみられるが、基本的に洪流水砂に覆われている状況で、どの河川が源であるか現在検討中である。昨年の成果では弥生時代から江戸時代に至る間、各時期の水田は自然災害を受けていたことから、川田の地は、水田經營→洪水→湿地ないしは復旧、のくり返しあつたように思われる。

出土遺物は木製品が圧倒的に多く、木器では鋤・鋤・田下駒等が出土し、特記すべきものに埴輪部材で高床埴輪の出入口部に用いられた棺材・蹴放し材が出土した。本遺跡では隕材の使用という形での出土であったが、県内で該期（弥生時代～古墳時代）に属す高床埴輪の棺材・蹴放し材の出土例を聞かないことから貴重な例といえる。


2. 水田の構造と畦畔による区画

川田余里遺跡のなかで、大星山系から赤野田川までを範囲としたA地区の状況を記すこととする。


検出された水田跡を時期的にみると、弥生時代の水田跡は基本的に调查区全域に広がっていると考えられるが、畦畔が検出され水田の区画が捉えられた箇所は調査区内でも部分的であった（註12）。

弥生時代の水田跡は比較的狭い範囲ではあるが2面検出でき、2面ともほぼ同じ位置で確認されている。この水田跡と後の古墳水田と大きく異なる点は、水田の立地と広がりではないだろうか。

十分検討がされていない段階であるので推測にとどまるが、弥生水田は古墳水田（註13）のごとく計画的に広い範囲を水田化する状況ではなく、比較的小規模な水田が地形を選んでつくられ、營



第4図 川田余里A地区全景
(古墳時代の水田跡)



第5図 弥生時代の水路跡(A 4地区)


まれていたようにも思われる。これは、小規模な範囲に水田が形成され、使用途中で水田雜草等により耕作不可能になった状況下では、雜草の刈り取りをせず能に新しい水田をつくる蒸窯をイメージできよう（註14）。弥生中期の水田跡は、自然流路と同じ方向に水路が確認され、この水路を用いて水田に水を引いたと思われるが、畦畔の検出がむずかしかったため直接、畦畔と水路の関係を明らかにする施設はわからなかった。しかし、弥

生後期になると畦畔による区画が整い、中期と同様に自然地形の傾斜に直交もしくは平行する方向に畦畔がつくられている。

古墳時代の水田跡は、本地区では3面検出され、前期の水田が大畦による不規則な区画であったことを除くと基本的に大畦と小畦の両者による水田区画で、水田は本地区全体に広がっていたと思われる。水田の区画で特徴的なものは、所謂「小区画水田」の展開で、大畦については内部に芯材として木材を多量に用いることが該期から一般的になった点である。特にこの両者が成立する時期が古墳後期であると考えられる。小区画水田は大畦によってまず一定の区画を設定し（第1次区画）、その中を小畦による小区画が大畦の方向に沿ってつくられると推定されるが、大畦単位で小区画の方向にちがいがみされるので、大畦単位により水利方法が変わっていたと推定される（註15）。また、大畦の中央部もしくは脇にU字状の渠り込みが確認されているので、大畦と水路は一体化していたとも考えられ、このような状況が普遍的にみられるのも古墳時代後期である。

3. 川田糸巻の水田跡

前記したが、昨年度（平成元年度）の水田跡の面的調査はA・C地区主体に実施された。A地区で弥生時代・古墳時代の水田跡検出に従事しながらもC地区の調査状況を目にする機会があったため、A地区とC地区の比較についてここで触れた。両地区を比較してまず第1にあげられる相違点は、土砂の堆積、特に水田面を覆う砂層の厚さで、堆積した土砂はC地区で弥生時代水田面から現地表面まで約4mをはかる。しかし、A地区で



第6図 古墳時代の水田跡(A4地区)



第7図 弥生時代の水田跡(A4地区)

は1.5~2mの厚さを示すため、両地区を「同一遺跡」という意識でみれなかった。この現場での意識と『年報』に掲載した土層柱状図を合わせて考えると、地形は現地表面ではほぼ平坦を示すが、弥生・古墳時代とも比高差は約4m認められる（註16）。このことから、大龜山系の山裾から保科川に向かって地形は傾斜し、七砂の堆積が保科川・県道付近で非常に厚いことがわかる。後背湿地の中央部に位置するC地区は、標鉢の底部にでも似た地形で、その低まりに水田を営み、越えることなく洪水をうけ、水田造成と洪水の繰り



第2図 C地区水田区画の変遷

返しであったように思われる。その地点（C地区）よりA地区を望むと、大屋山系の尾根にかこまれ、小高いようにもみえる。A地区とC地区の中間（B₁地区）では赤野出川と思われる砂礫層が多量に堆積し、河川の流路変更が施え間なく行われた地であったことを物語っている。この川が一種の「境」を意味しているように思え、C地区の人々が洪水と戦いながら水田經營を続いている際、川の反対側に位置し、山にかこまれたA地区では、小高いため洪水があまり及ばず、何ともいえぬ静けさの中で排水とは無関係かのごく水田が古くから連續と続いていたと思われる（註17）。

「丹田条里」という同一遺跡内にあって、水田を営む人々の意識、さらに景観がちがうようにも思われたのであえて記した。

以上は、調査に参加した者として、C地区からA地区を望むと如何なる姿にみえたかについて思い入れも含めた感想を述べたが、本報告がされていない現在、遺跡の評価に陥れることは危険である。調査ではA地区を担当して、毎日現場と接しているうちに、西側にそびえる不動の山にかこまれた「場」が存在し、それは開かれた「場」であるC地区と対照的に連続していた印象をうけた次第である。

この印象をうけながら調査を進めている最中、初めて水田跡の研究会に参加した。ここで学んだことは数知れないため、次項ではその一端を報告したい。

III. 「第2回 東日本の水田跡を考える会」に参加して

前年度の第1回は、「水田跡を考える集い」と題していたが、平成元年度より「考える会」と変わり、研究会としては1年目の年であった。

期日は、10月21日～22日の2日間で、仙台市富沢遺跡付近で行われたが、その内容は大きく3つに分けられる。①富沢遺跡の見学、②中在家南遺跡出土の木製品の見学、③全国各地の調査報告と討論、であった。

1. 宮沢遺跡（第35次調査）

の見学


研究会に参加した頃は、「水田」と「川畠条里」の印象が合致していたため、「広大な面積」「埋没水田」のイメージを水田跡に対して持っていたが、仙古の水田はそのイメージと大きくちがう点が多くあった。調査方法では宮沢遺跡で1年間に調査する面積は約1~2,000m²で、現耕土層を取り除いた後は、基本的に最終面まで手掘りで下げて水田跡を検出する方法をとっていた。土層断面では、川畠条里のように明確に砂層に覆われた水田はみられず、粘性の強い水田層が連続している状況がみられたため（註18）、面的に畦畔が検出可能か、また可能な場合、畦畔はどのように認められるか、の2点について観察を始めた。調査では「畦畔状の遺構が検出はされるが、そのすべてが水田に伴う畦畔と認定はできない」とのことと、上層水田が下層水田を耕作時に破壊した場合、どのように破壊したかも面的に捉えられるようである。見学した水田跡は古墳時代の小区画水田で、調査区ほぼ中央部に蛇行する川が流れ、そこから水を水田に引いたようである。

2. 中在家南遺跡出土の木製品

見学した印象は、木製品の残存状況が良好であることである。木製品は木器が圧倒的に多く、繩・鐵が多量にみられたが、注目すべき遺物として、外形は木器の一體にみえるが明確に判断しがたい木製品である。これは木器の製作過程（未完成品）のもので、完成に至るまでの過程が2~3段階明らかにできる木器もあるようであった。これについては、報告書の刊行を期待したい。

3. 各地の調査報告・討論

調査報告は、スライドを用いての発表であった



第9図 宮沢遺跡 古墳時代の水田跡



第10図 宮沢遺跡 上層断面

が、発表した遺跡が東北・群馬・静岡の3箇所に分けられたことは、この地域での調査例が増加していることもさることながら、最近、調査法などで成果をあげている地域にも外ならない。報告会では調査事例の増加におどろくとともに、調査法について、遺跡によって畦畔の検出状況は異なり、畦畔の見方方は一様でなく多種多様であるため、やはり水田の調査法も遺跡の状況により変えるを得ない、と感じた。討論では時間の関係上あまり深い点まで話されなかつたが、ここでは興味深かった点を中心に記すこととする。

まず、水田跡調査で検出される足跡について、発見された足跡がいつの水田に帰属するかを明ら

かに捉えられるか、という点から始まり、足跡からは当時の人々の農作業の方法・歩行状態・作物の状況などさまざまな情報が得られるが、現在、足跡の発見例が多いにもかかわらず、足跡の位置づけがあまりなされていない。要は足跡と水田づくりとを農作業の過程の中で位置づけられるかどうかが問題となった。次に擬似畦畔についてであるが、富沢遺跡の報告書で吉野氏が述べている擬似畦畔A・B（註19）についての認識が、研究者間で統一されていないことと、擬似畦畔は東北地域に限られてみられる遺構（？）か、それとも水田跡一般にいえることなのか、の2点が話された。すべての高まり＝畦畔、という考え方については否定されたが、擬似畦畔の存在を疑問視する意見もあり、「擬似畦畔」の認識が研究者により若干異なっていると思われた。類例の増加を持つことになろう。

最後にプラント・オバールについてであるが、プラント・オバール分析について以下の質問が提出された。^①イネのプラント・オバールは確認されなくても畦畔が検出された。^②反対に、プラント・オバールが認められたが、畦畔が検出されない。

このような状況は一地域に限ったことではなく、全国各地の水田遺跡で誤騒として残されていることであり、これについて出された意見（解説）をまとめる。①プラント・オバールは洪水でも流される。^②山方が悪い。^③稲作を行っても水田内のイナワラを外に持ち出す状況であると、プラント・オバールは出ない。^④水田でイネ以外のものをつくった。の以上4点になる。特に3番目の解説は、かりに水田であってもつくったイナワラを水田に還元しない限りプラント・オバールは認められない、という意見には興味を持った。これにより、イネの刈り取る方法によってはプラント・オバールの量が変化することを知られた。全般的にみると、絶して弥生時代の水田跡から多く検出され、古墳時代に減少する傾向があるようである（註20）。

以上、短期間の研究会ではあったが、見るもの聞くものすべてが初めてであった。それを今日、「川田条里」の調査に生かしているかどうかは疑問があるが、有意義な日々であった。

この研究会で最も知りたかったことは、畦畔の検出法であった。埋没水田はともかく連続する水田の場合に、畦畔を面的に捉えるための方法は如何なるものであるのか。したがって、擬似畦畔・耕作域・非耕作域については注目した。埋没水田以外の状況では、面的に広げた際、明確に高まりを持つ畦畔は現れない。その折、何を畦畔とするか、について松本平で「不安」として抱いたため、この研究会に回答の一節を求めたわけである。この短期間にそれを求めることは無理であったにしろ、少なくとも各地で「畦畔」がどのようにみえているか、を私なりに捉えられた気がする。

IV. 調査上の問題点

1. 断面から平面へ

水田跡調査において断面観察の重要性はいうまでもない。川田条里・石川条里遺跡と現在当センターで調査中の水田遺跡では（註21）、面的調査に先行して調査区の四方に排水溝を整えたトレーニングを施し、トレーナーでの断面観察により現地表面下に存在する水田跡の広がり・残存状況・等を把握した上で面的調査に移行している。ここでは断面観察において注意すべきことを2～3触れてみたい。

「断面観察に如何なることを求めるか。」については詳細な点で研究者間に見解の相異がみられるが、面的調査に移行する前段階の調査として、水田土壌の確認と水田層の残存状況を捉え、面的調査の可能な水田層を判断すべきである。かりに、弥生時代から今日に至るまで自然災害を全く受けていない地域であれば、下層から上層にかけて水田上塗が連続と疏く状況を呈すと思われる。この状況下では、下層水田は上層水田の影響（耕作）をうけるため、基本的に畦畔は残存していないことになる（註22）。しかし、埋没水田の場合には短期間に水田がパックされ、この火山灰・砂が存在することで上層水田の耕作から下層水田を守る役わりをも果たし、「埋没水田」では検出が可能になるといえる。昨年度の調査では、水田面とそれを覆う砂層との間にピート層が形成されていることが観察された。水田面上部をこまかく観察することで埋没時とその後の経過を推定できるので、この点に注意したい。

次に、「畦畔」の認定であるが、擬似畦畔A・Bの例を出すまでもなく水田面に高まりが認められた際、それを辺・畦畔と認めることはできない。

畦畔はその層のみならず上・下の層がどのように堆積した屢か、を把握した後に認定されねばならない。畦畔は水田層と同様な土でみられることが多いが、部分的修復を行った畦畔は水田層と異なる土の盛り上がりとしてみられるため、帰属する水田面を確認しやすいこともある。断面観察で水田土質・畔畔・杭跡等がみられた際は、洪水など自然災害の有無とともに、洪水後の復旧の過程も捉えてから面的調査に移行したい。

面的調査ではどの層で広げるかが問題とされるが、この点について、以下のとく2段階で考えたい。

第1に、自然災害により砂礫で覆われた水田が存在した場合には、この層での面的調査を優先して考えたい。同地区で堀切水田以外の水田土質が認められ、畦畔状の高まりがみられる層が存在した際には、第2としてこの層で広げたい。しかし乾燥では粘土を除く・マンガンの集積により検出可能であるが、湿田では不可能に近いと思われる。面的調査で大型の機械を使用して下げていく方法では耕作土がうすい場合、下層の水田を露出してしまうおそれがあるので十分断面観察を行った上で面的調査は実施したい（註2）。

水田にとって取水と洪水は切っても切れない縁であるように洪水と復旧（水田）も同様で、常に水田は洪水をうけやすい地域であれば復旧を行って、その結果変化していくと考えねばならず、復旧の方法も一様でないことを念頭におく必要があろう。


2. 水田面と畦畔の検出

平成元・2年度と調査した水


田遺跡が洪水砂による災害を多く受けた状況下であったため、本文の内容が「掘削水田」について主に記すことを御了承願いたい。

洪水砂に覆われた水田跡は、ほぼ当時の姿を残している認識で当初調査を行っていたが、砂層下にある畦畔の上部は砂層の堆積がうすいと上層の水田耕作で削られる場合があることがわかった（第11図）。また、砂は火山灰と異なり洪水で押し流され、結果としてそこに堆積したため、流れが速いと水田面・畦畔は土砂とともに流れてしまうこともある。調査を行ってこの2点を特に実感した。

「連没水田」の調査では、砂層を除去し畦畔等を検出するが、砂を用いて畦畔を修復した遺構



第11図 古墳時代の水田層土層断面(A 3-④区)



第12図 弥生時代の大畦検出状況(A 3-②区)

(施設) を譲って譲ってしまうおそれがある。

水田の修復に砂を用いることを調査を担当して始めて知ったので、「埋没水田」であるからといって砂を除去することのみに従事してはいけない(註24)。一方砂に頼られていない畦畔の検出も実施した(第12図)。土層断面で微粒の水田土壤が連続する状況の中で、ほぼ同位置に大畦がつくれていたため、下層水田の大畦は破壊されず残存していたのである。

調査は断面で認められた大畦を中心に上層水田の耕作土をはぎとり大畦を検出したが、粘土を握る作業である点と、土色・土質のちがいを明瞭に区別できない点とでむずかしい検出であったが、その結果、立体的な姿を露呈できた。これも大畦の位置がほぼ同一地点であったがために確認できたものである。

3. 面的調査に求めること

断面観察は水田跡の存在・残存状況を把握するための一手段である。したがって、断面観察でもある程度水田跡の情報を得られるが、そのほとんどは面的調査に求めることになる。

面的調査において水用跡から得られる情報は、大きく2つに分けられると思う。第1は、広範囲にわたって検出された水用跡(畦畔・田面・等)から水田の広がりと構造を捉えることができる。調査では検出遺構から水田の立地と広がり、水田の区画から推測される取水・排水の方法を考えること。いわば水田跡の存在とそこに展開する水田の景観から明らかにできることを考えたい。1例を示すと、昨年の成果では人柱と小畦の両者が存在し、この両者により組織的な水田が形成されること。人柱で大区画を設定し、そのなかを小畦により「小区画」に区画する方法がみられるが、その成立時期を古墳時代後期頃と比定できた。これとともに土地利用・土木工事の方法も合わせて最終的には水田が存在する歴史的背景を明らかにしたい。

以上のことから面的調査から得られる最も重要な情報で、田面の規模・畦畔の方向・現象里景観(条里型地割)との関係が把握できる。

第2は、水田跡の構造についてであり、水口・水路・畦畔の構築方法等こまかに点について多くの情報がある。これについては前記した全体的

なことと合わせて、各時期ごと・地域ごとの変遷・変化を捉え、水田の実態を明らかにしていく必要がある。

最後にプランツ・オバール分析についてであるが、断面観察の時点で採取することはもちろんのこと、面的調査を実施した水田面でも採取したい。プランツ・オバール分析では、寄森県垂御遺跡で大きな成果をあげていることからも(註25)、水田面では大畦・大畦付近・小畦・水口一箇内等各地点で採取し、稻作の状況などを1面のみならず、各面(各時期)ごとにその変化なりを考えたいたい。

面的調査では、埋没水田の場合自然災害をうけた直前の姿を露呈でき、私たちに「一時期の水田の姿」を視覚的に示してくれるその意味は非常に大きいと思う。

V.まとめと課題

平成元・2年度の2ヶ年は、「川田条里」一色の調査で「土と水」と題しながら畦畔検出に専念し、検出された水田跡をどう理解するかを思索する毎日であった。水田づくりの経験・土壤学・農学の知識が無きに等しい私が毎日「水田」を調査し、そこで抱いた「夷感」を本稿では記したわけである。したがって研究論文・研究ノートとは若干異質であることはもちろんのこと、紙面をよごしてしまった感で申し訝なく思っている。

水田跡の調査では、出土遺物(特に土器)が少なく、遺構としても木組みの水路跡・杭列・等を除くと土の高まりか溝状の落ち込みの両者を検出することに尽きる。したがって、集落遺跡以上に調査距離を明確に設定し、それに沿った調査を実施しないと單調な調査に終始する危険がある。

長野県内で水田跡の調査は実施されてはいるものの規模は比較的小さく、未だ全国的視野の内の位置づけは調査・研究ともなされていないようと思われる。かかる状況下にあって、現象里景観下を約10万m²に及んで調査を行った「川田条里の成果」は貴重な水田の歴史を織る文化財である。したがって、現段階では水田の成果を十分に語れないので、本文は調査の実践を基に問題点を示したこと終始し、調査の現状と成果を伝えることを目的とした。

川田の成果には多大なものがあり、この成果を如何にまとめるかは大きな課題である。検出された水田跡を理解するためには、若穂地区での水まわし（水の流れ）を捉え、各時期ごとの地形（微地形）を復元し、水田の立地・土地利用を明らかにした上で、検出した水田跡の解釈を行い、そこに水田をつくった主体者、つまり川田条里の水田を若穂地区を含めた長野県の歴史の中に位置づける仕事が不可欠である。

川田条里の水田跡は、調査終了とともに高速道

の工事が入り、最終的にはそこに上信越自動車道が通る。

「記録」としてのみ残る埋蔵文化財を市民の方々に還元するための機会を設定することは、調査した者の義務で、また、研究者に公にすることも義務である。その日が早いことを望みたい。

最後に、昨年度調査を実施しているなかで、多くの方々に協力と賛同を賜った。今日までの御指導に感謝するとともに、今後とも変わらぬ御指導・御教示をお願い申し上げる。

註1 水田跡調査の経過については、工農書選氏の論考を参照されたい（工農 1983）。

註2 石川泰里・川田条里遺跡の本報告は、未だ公にされていないため、調査の成果については『年報』5・6を参照されたい。

註3 佐平洋祇園における調査の成果は7冊の報告書にまとめられ、北中透跡は第7分便に収録されている。

註4 北中透跡では調査者が自然地盤層は認められず、基本的に水田が継続している状況で、廻的脚石では鉄・マンガンの量積の度合いで時期を推定した。

註5 川田の場合は、鉄・マンガンの量積により時期を推定することは可能であるが、畠田ではかなり困難と思われる。

註6 芦真については、『年報』6で使用したものの他に若干、現場で撮影した写真も用いた。また、若穂地区の略図は平成2年3月に行われた展示企画に当センターの吉沢信寺氏が作成した図を用いた。

なお、水田遺跡の調査については、「水田遺跡調査の観点と方法」と題す一文をまとめたいと考えている。

註7 大里山古墳群は、現在古センターガ調査中である。

註8 12ヶ所に設定したトレチの土層断面では、第1トレチで現駐車の底面約40cmの位置で水路をともなう旧畦跡が認められている。

註9 大竹重昭・河西克造「川田条里遺跡」（『年報』6・鶴長野県埋蔵文化センター・1980）。

註10 川田条里遺跡A-E地区のなかで、C地区付近が最も上砂等の堆積が厚かった地点である。

註11 現在、B₂地区で調査を実施しており、発生時代～平安時代に至る水田跡をも調査している。

註12 水田土壤は調査区のほぼ全般に認められるが、共生中期の水田跡は赤野田川付近で、共生後期の水田跡は同地點と調査区中央部の一角で検出された。

註13 調査区域で水田の汎用が認められたのは、古墳時代後期の水田跡である。

註14 当センター白堀直氏よりこのような事例が抱負で認識されていることを教示された。

註15 偶然のことながら、小區面水口（小丘）に設けられた水口は、地形の斜傾と河方向に多くみられた。

註16 現地では約2mの亢高差はある。

註17 赤野田川は、現在の位置とあまり変わらない程度の流路変更を幾度となく行わされたことを前提で考えている。

川を「境」としたのは、川を境に水田の經營・利用方法が若干ちがうということと、人々の意識の中に川が境的性質を有していた、この両者を含めている。また、水田の景観について触ると、大里山古墳から眺めた川田条里（八地区）の景観は、森将軍塚古墳から見た更道条里、川柳将軍塚古墳さらみに石川条里の姿と非常に似ている。

註18 富沢遺跡の土層については、見学者が短時期であったため十分理解はできていないが、川田条里と同様な埋没水田とは構相が異なっていた。

註19 離似畦跡については、（吉野他 1987）に記されているが、離似畦跡は畦跡の直上に認められる自然堆積層の高まりを示し、離似畦跡は水田の畦跡の直下に認められる畦跡状の高まりを示し、後者は水田耕作の影響をうけない状況下であるため、下部が畦跡状に残るものである。

註20 これについては（杉山 1987）に詳説に述べられている。

- 註21 石川条里遺跡の調査は、平成2年夏の7月で終了の見込みである。
- 註22 下層水田の畦畔の位置を上層水田の畦畔が踏襲（コピー）している状況では畦畔は残存する。
- 註23 水田は復旧（修復）が行われたりすることで、形がさまざまに変化する。一時潮の水田の「姿」を露呈するためには自然災害等により短期間に廃絶した状況が不可欠といえる。
- 註24 断面観察の際に「修復」の有無とその状態を把握し、両的調査では断面観察の成果を生かし畦畔を検出すべきである。なお、修復について触ると、現在調査中の川田条里（B₂地区）では弥生時代～江戸時代に至る水田跡の中で、砂を用いて畦畔を修復している水田は平安時代に限られた。
- 註25 青森県平野遺跡では、約200地点プラント・オバールを採取し、その成果から水田の広がりと播種の様相を推察している。

参考文献

- 福山 学司 1978 「古代水田跡の発掘調査」『月刊文化歴』181
- 遠藤 正次 1987 「青森県平野遺跡の弥生水田」『考古学ジャーナル』273
- 大竹薫明・河西克道 1989 「川田条里遺跡」『乍櫻』6 06長野県埋蔵文化財センター
- 菅野 一郎 1957 「無機質水土族の基本的新面形態」『日本土壤肥料科学雑誌』27
- 工堀 審通 1983 「水田遺跡発掘の経過と現状」『地理』28-10
- 吉野裕恭他 1987 「宮沢-宮沢遺跡第15次発掘調査報告書」仙台市教育委員会
- 鈴長野県埋蔵文化財センター 1989 「北中遺跡」『中央自動車道長野埋蔵文化財発掘調査報告書』10
- 〃 1989 「川田条里遺跡・現地説明会資料」
- 〃 1990 「川田条里遺跡・見学のしおり」
- 長野市教育委員会 1983 「浅川層状地盤跡和田遺跡・川田条里的遺構・石川条里的遺構」
- 〃 1988 「町川田遺跡」
- 日本考古学協会 1988 「日本における耕作農耕の起源と展開」一資料集一
- 八賀 啓 1967 「古代における水田開拓」『日本史研究』96
- 東日本の水田跡を考える会 1989 「第2回・東日本の水田跡を考える会」一資料集一
- 松井 健 1970 「岡山県津島遺跡における弥生時代の灌漑水利用水川の存在について」『考古学研究』64
- 村越・遠藤他 1985 「農耕法跡」青森県教育委員会

遺跡の整理におけるコンピューター利用について

——下戸内遺跡での実践例から——

小林 秀行

近藤 尚義

I. はじめに

II. コンピューター導入までの経過

1. 水平分布図作成の問題点

2. 垂直分布図作成の問題点

III. システムの概要

1. 概要

2. ハードの構成

3. プログラムの構成

IV. 実践の手順

1. 生データーの作成

2. 基本データーの作成

3. 分布図の作成

V. 実際の作図例

1. B01ブロック水平・垂直分布図作成

(1) 水平分布図作成

(2) 垂直分布図作成

2. B13ブロック接合状況図作成

(1) 出土遺物について

(2) 水平接合図作成

VI. 今後の課題

VII. おわりに

I. はじめに

長野県埋蔵文化財センター佐久調査事務所では、昭和63年4月から平成元年5月にかけて佐久市香坂の下戸内遺跡の調査を行った。調査地区内を地形条件からA～E地区に分割して調査した結果、西に流下する香坂川の左岸小段丘上に位置するB地区から、八風山系産出の黒色緻密な安山岩を素材とした多量の槍先形尖頭器（以下尖頭器）と剣片等を検出した。現在、整理作業を進めるなかで、尖頭器製作跡としての遺跡の在り方が、次第に復元されつつある（註1）。

整理作業開始から発案になっていたことは、発掘調査時に摩擦処理した3万点におよぶ遺物の分布図（水平・垂直）の作成であった。この問題は、コンピューター導入によってかなり解消されてきている。

長野県内においては従来このような機能を利用してした調査、整理作業例がないという事情もふまえ、一つの実践例として紹介したいと思う。

II. コンピューター導入までの経過

本遺跡における遺物出土状況は、密集して検出される場所が多いこと、總点数が約3万点におよぶことから、分布図の作成にかなりの時間を費や

すことが予想された。

おもに必要とされる分布図は、以下のようである。

A. 全点の水平分布図

イ. ブロックごとの水平・垂直分布図（34ブロック、垂直分布1ブロックについて2方向）

ウ. 器種ごとの水平・垂直分布図

エ. 個体別資料ごとの水平・垂直分布図

オ、接合資料の水平・垂直分布図

カ、諸属性による分類別の水平・垂直分布図

1. 水平分布図作成の問題

実際には手作業で遺物取り上げ台帳から一部のブロックについて水平分布図の作成を試みたが、かなりの時間を費やした。さらに密度が高いので、全点1枚の図面に作図するとその後、図から取り上げナンバーと点の読み取りが不可能な状況になる。そのため25点区切りで作図しなければならず、1ブロックでの図面が100枚になった。この状況では、ブロックの全体像が把握しづらく、遺物分類をした後の分布図からの検索、抽出が困難である。

2. 垂直分布図作成の問題

さらに現場における遺物出土地点は、主に旧流域辺部に位置しているため、場所によればかな

り急な傾斜が見られる。さらに遺物を包含する層が複数にわたり、ブロックの埋没状況を検討するためには、さまざまな角度から垂直分布状況を観察する必要が生じた。しかし、1のような状況では、図面作成がさらに難しくなり、時間をかけざるをえない複雑な操作を必要とした。

以上の問題点を解消し、本遺跡の整理作業をすみめるにあたっては、コンピューターを導入することが、必要不可欠であるという認識にいたった。さらに、コンピューターの特性である、スピーディーな作図・検索・抽出と、正確な分布図作成を最大限に利用できるのである。

このような状況から、関係機関の理解を得てコンピューターを導入するに至った。

II. システムの概要

1. 概要

今回のシステムは、御古代学協会と京都コンピューターシステム社が共同開発したものを、同コンピューターシステム社と販売契約を結び使用した。

使用したシステムは、本来発掘調査における遺物取り上げ時から起動するものである。概略は、遺物の出土地点の記録を從米のような手作業による計測にかえて、光波距離計で測量し、接続したハンドヘルドコンピューターによってX、Y、Z座標に変換させたうえで、そのデータをRAMファイルに格納する。さらにRAMファイルからパーソナルコンピューターへコンバート（転送）し生データとして、ハードディスク等に蓄積するシステムになっている。そのため発掘調査時は、手入力の必要はほとんどない。

しかし、本遺跡の発掘調査は、当埋蔵文化財センター調査方針により小地区と呼ぶ2mグリッドごとにNo.1から出土遺物にナンバリングをし、出土地点の記録は、グリッドの北西角を基準として、南北方向、東西方向および標高値をすべて手作業で計測し、遺物取り上げ台帳に記録した。そのため今回使用したシステムは、発掘調査時からのものではなく、遺物出土地点の座標、遺物の種類、層位をパーソナルコンピューターへ全点手入力するシステムに変更されている。

2. ハードの構成

本システムの起動に関して使用したハードの構成は、以下のものである（註2）。

パソコンコンピューター

NEC PC-9801RX (16ビット)

ディスプレイ

NEC PC-KD854

ハードディスク

LOGITEC LHD-34HR (60メガバイト)

プリンター

NEC PC-PR201G (B4)

ペンシルプロッタ

MAX NP400 (A2)

3. プログラムの構成

(1) 発掘調査現場で2mグリッドごとに計測した遺物の出土地点の座標、遺物の種類、遺物番号層位を遺物取り上げ台帳から手入力でのパソコンコンピューターに格納する（生データー）。

入力後は、データーリストをプリントアウトしてデーターの訂正をおこなう。訂正等がすんだ後にプリントアウトされたデーターリストは、座標を中心とした遺物取り上げ台帳になる。

(2) 生データーに遺物の分類、分析結果などの属性をつけ加え手入力する（基本データー）。

(3) CRT（ディスプレイ）によりその分布状況を確認したり、プロッタによって各属性ごとの水平・垂直分布図を作成する。

IV. 實践の手順

1. 生データーの作成

遺物取り上げ台帳に記録された遺物の厚標値、層位、種類（器種）をパソコンコンピューターへ入力する。出土地点は、X、Y座標に計測し変換されるが、ここでは、国土地理院のユニバーサル横メルカトル図法の平面直角座標系（第8系をX=0.0000、Y=0.0000）を原点に、遺跡内のX=29,360、Y=7,000を任意の基準点（X=0、Y=0）として変換させた。Z座標についてもパソコンコンピューターで計算・変換も可能ではあったが、水系レベル値が一定ではなく、変換の操作が複雑になるため、水系レベルと読み削りより計算して入力した。

また、全点を單一ファイルにすると検索速度が

かなり遅くなるため6000点から7000点の遺物データが1ファイルとして4ファイル作成した。入力が完了した時点で全点の水平・垂直分布図は、層位・種別分類から作図が可能になる。

これらの入力は当事務所の整理作業員が、二人一組の半日交換でおこなった。当然のことながら、手入力の限界のため誤入力がでてしまう。そのため、すべてのデータについて、正誤確認を行った。

2. 基本データーの作成

さらに、個々の遺物の属性を生データーにつけて加えた基本データーの作成を行う。多岐にわたる遺物の属性の記録方法は、從来カード式の台帳等を利用し検索をしていた。しかし、一度コンピューターにデーターを、格納すれば、その検索は非常に効率的であることは言うまでもない。また、基本データーは、生データーに付加するので、出土地点に属性を補完するというかたちになる。したがって、種々の属性分類を用いて遺物の分布状況の把握がすみやかに行えることになる。今回は石器の属性、特に槍先形尖頭器製作時に生じる調整剝片の属性に主張をおき、計測値も含めて、21項目(註3)設定した(第1表)。この項目については容量の限界はあるものの、整理目的によって自由に設定ができる。

なお、基本データーについても生データーと同様に検索速度の関係から複数のファイルに分けて格納している。

この入力は、整理の進行状況にあわせて随時、追加・訂正のかたちで進められている。

3. 分布図の作成

作成された基本データーをもとに、水平・垂直分布図をプロッタによって作成するのであるがその利点を概略する。

①任意の作図範囲の設定。②境界はあるものの縮尺の自由な選択。③記号、色分けによるさまざまな属性の表示。④取り上げナンバー表示の有無さらに垂直分布図においては、あらゆる角度から任意の投影幅の分布状況を作図できる。

分布図は、ブロック別分布図、個体別資料の分布図、器種別分布図等、さらに基本データーの項目にとづいて、複数の属性をかけあわせて作図することもできる。たとえば「B02ブロッカー個体別資料No.3-打刃形態」に該当する資料を検出し分布図にすることができます。

接合状況を示す分布図については点のみではなく、剝離順に直線で結ぶことを検討した結果、基本データーと別のプログラムを作成し、グリット名と取り上げNo.を入力した。

なお、プロックによる圓化操作と同様な操作に

| 【生データーリスト】 | | | | | | | | 【アーチカルリスト】 | | | |
|------------|-------|------|------|---------|-------|-------|--------|------------|---------|-------|-------|
| [No.] | [発見] | [備考] | [属性] | [No.-S] | [E-W] | [E-W] | [Y-Z] | [Y-Z] | [X-Y] | [X-Y] | [Z-X] |
| 4573 | 44005 | 1551 | P | 9 | -0.64 | .42 | 28.940 | 14.230 | 915.546 | | |
| 4574 | 44006 | 1552 | P | 9 | -0.05 | .01 | 28.950 | 14.210 | 915.500 | | |
| 4575 | 44007 | 1553 | P | 9 | 1.18 | .38 | 28.960 | 14.190 | 915.450 | | |
| 4576 | 44008 | 1554 | P | 9 | 0.48 | .08 | 28.940 | 14.020 | 915.542 | | |
| 4577 | 44009 | 1555 | P | 9 | 1.19 | .1 | 28.910 | 14.160 | 916.500 | | |
| 4578 | 44010 | 1556 | P | 9 | 1.17 | .09 | 28.750 | 14.040 | 916.480 | | |
| 4579 | 44011 | 1557 | P | 9 | 1.24 | .07 | 28.760 | 14.070 | 915.571 | | |
| 4580 | 44012 | 1558 | P | 9 | 1.24 | .16 | 28.700 | 14.150 | 915.545 | | |
| 4581 | 44013 | 1559 | P | 9 | 1.37 | .17 | 28.720 | 14.120 | 915.532 | | |
| 4582 | 44014 | 1560 | P | 9 | 1.28 | .01 | 28.730 | 14.130 | 915.524 | | |
| 4583 | 44015 | 1561 | P | 9 | 1.29 | .03 | 28.740 | 14.140 | 915.523 | | |
| 4584 | 44016 | 1562 | G | 9 | 1.29 | .05 | 28.610 | 14.080 | 913.505 | | |
| 4585 | 44017 | 1563 | P | 9 | 1.24 | .15 | 28.660 | 14.180 | 913.556 | | |

| 地名 | No. | 性 | 名 | 時間 | 高 | 石 | 傾 | 鉄 | 骨 | 木 | 瓦 | 灰 | 瓦 | 泥 | 漆 | 織 |
|------|-------|------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|-----|
| 1551 | A4005 | 1551 | 0 | | | | | | | | | 3 | 16 | | | |
| 1552 | A4006 | 1552 | 0 | | | | | | | | | 2 | 6 | 34 | 8 | --- |
| 1553 | A4007 | 1553 | 0 | | | | | | | | | 1 | 100 | 0 | | |
| 1554 | A4008 | 1554 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1555 | A4009 | 1555 | 0 | | | | | | | | | 1 | 6 | 27 | 9 | --- |
| 1556 | A4010 | 1556 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1557 | A4011 | 1557 | 0 | | | | | | | | | 1 | 6 | 27 | 9 | --- |
| 1558 | A4012 | 1558 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1559 | A4013 | 1559 | 0 | | | | | | | | | 1 | 6 | 27 | 9 | --- |
| 1560 | A4014 | 1560 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1561 | A4015 | 1561 | 0 | | | | | | | | | 1 | 6 | 27 | 9 | --- |
| 1562 | A4016 | 1562 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1563 | A4017 | 1563 | 0 | | | | | | | | | 1 | 6 | 27 | 9 | --- |

第1表 生データーリスト(上)・基本データーリスト(下)

よって、生データーからディスプレイ画面でも層位・種別による、水平・垂直分布図を色別で表示することが可能である。このことは、プロッタからの出力も含めてデーターをあらゆる条件下で作図しながら、フィードバックを短時間で繰り返すことが可能になった。従来であれば、その都度、かなりの時間をかけて作成し直さなければならなかつたことであり、データーの検索等の機能も含めてコンピューターユ用の最大のメリットといえる。

その他

計測値（最大長・最大幅・重量等）から調査グラフの作成も可能である。さらに、ある属性をもつ遺物の総数に対する比率等も計算可能である。


V 実際の作図例

1. B01ブロック水平・垂直分布図作成


(検出層序・X V層、取り上げ点数約1800点)
本遺跡の遺物分布状況の特徴は、旧流路に沿った微高地およびその縁辺部にみられることがある。

本ブロックは、その縁辺部にみられるブロックのひとつである。したがって、垂直分布状況は、地形の起伏に沿った形狀を示すことが予想された。


そのため従来の手作業による垂直分布図作成ではX・Y軸に基準線をのせた垂直分布図（見透し図）を作成するのが第一歩な作図作業が、地形を考慮した方向、つまりここでは、旧流路方向からの見透し図の作成が可能になった。以下、今回作成した水平・垂直分布図作成の条件設定を参考ま



第1図 B01ブロック周辺遺物分布図 (1:50)



第2図 B01・B14ブロック遺物水平分布図 (1:30)



第3図 B01・B14ブロック遺物垂直分布図〈上：A方向・下：B方向〉(1:30)

で紹介したい。

(1) 水平分布図作成(第2図)

作図範囲を縦方向3m・横方向3mに設定するとプログラムは、プロッタに作図できるA2版の用紙(トレーシングペーパーG、W65使用)の最大縮尺値1/7を自動的に算出する。ここでは、それより小縮尺の1/15に設定した。

記号の表示は、種別F・L(2cm以上の剥片)を0.6mmの黒ペンで径1mm強の「○」を書くように指定、さらに種別C・G(2cm以下の剥片・碎片)を0.2mmの黒ペンで径約1mmの「○」、種別P(尖頭器)を0.2mmの黒ペンで一辺約1mmの「△」、種別N(安山岩原石)を0.2mmの黒ペンで一辺約1mmの「□」にそれぞれ指定した。

(2) 垂直分布図作成(第3図)

ここでは、地形を考慮しない直標軸をのせた1方向と地形の傾斜方向にあわせた1方向の計2方向について作成した。

地形の傾斜方向にあわせた分布図の条件設定は以下のとおりである。

見通しの基準線を設定し、その始点(P1)と終点(P2)それぞれのX、Y座標値(P1:X=30, Y=48, P2:X=30,000, Y=51)(註4)を入力する。次に作図したい範囲の設定として、基準線からの投影幅4mを選択する。(第1図)その時点で範囲内の遺物のZ座標の最大値、最小値をコンピューターで確認し、垂直方向の範囲(ここでは最大値918.500m、最小値917.300m)を設定する。縮尺は、平面図とあわせて垂直方向、横方向ともに1/15にした。

記号は、全点0.6mmのペンによって径約1mmの「○」を指定した。

以上の条件で操作をおこない作成したのが第3図である。地形に沿わない座標軸を基準線にした第3回上と、傾斜する地形に沿った見通しラインを設定した第3回下を比較すると、第3回下の垂直分布図は、隣接するB14ブロックとの境界部分を比較的明瞭に見せている。さらにその分布は、本ブロックの在り方をより忠実に復元しているのみならず、旧流路の縁辺部の微地形を推定させるデーターも提供している。

2. B13ブロック接合状況図作成

(検出層序・XV層、取り上げ点数約400点)

本ブロックは、接合状況のプロックによる図化の例として取り上げた。検出地点は、旧流路からやや離れた縦傾斜部である。

(1) 出土遺物について(第6・7図)

ここで本論の趣旨からはやや逸脱するがまず出土した遺物についても簡単に説明しておきたい。遺物は、剥片・碎片がほとんどで尖頭器、他の器類はない。しかし、剥片のなかには、數点リタッチが施されているものもある。個体別資料については、複数の個体の存在は見られず、單一個体によって占有されている。


接合資料は121点(53剥片)が接合した接合資料No.1と、74点(39剥片)が接合した接合資料No.2の2点がある。この接合資料は、共に30cmを越える大きな尖頭器状を呈し、互いの接合関係はみられないが、その形状と規模からひとつの尖頭器製作の際に剥離されたもの(註5)と推測される。さらに遺跡内から出土したすべての槍先形尖頭器との比較を試みたが、現時点では接合するものはまだない。

現在もこの接合資料については、継続して接合作業をおこなっているが、背面側に接合する剥片は既に存在しないといえる。さらに接合資料の現在までの剥離状況を観察したところ、その製作工程は、次のように想定される。①原石の石理にそって大きな剥片を剝離。(分割と呼ぶべきかもしれない)。②次に粗い剥離で尖頭器状に整形。③器体の背面側から裏表にわたる平坦剥離を、先端部と基部を結んだラインを越えるように繰り返し施す。④③を繰り返しおこない、より薄い凸レンズ状の断面、さらには目的とするかたちに整形。

しかし、本ブロックでは、①と②の工程に係する痕跡がないことから、遺跡内、遺跡外のどちらかでそれらの工程を終えてから持ち込まれ③と④がおこなわれたと推測することが妥当と思われる。なお、④のあと最終的な刃部の作出をおこなって完成し遺跡外へ搬出されたのか、④の途中で完成しないまま遺跡外へ搬出されたかについては、不明である。


(2) 水平接合状況

ここでは、ブロック間での接合などの意味は持たないことも十分に予想されるが、水平分布の広がりの中で2つの接合個体がどう分布するかをみ




第4図 B13ブロック遺物分布図 (1:20)


Z4



第5図 B13ブロック接合資料No.1(左)No.2(右)接合状況(1:10)



第6図 B13ブロック・接合資料No.1実測図 $S = 1/4$



第7図 B13ブロック・接合資料No.2実測図 $S = 1/4$

たい。

接合に関係するデーターとして、グリット名、取り上げナンバー、剥離番号（剥離順番）、剥片番号（ひとつ前の剥片が複数に折れている場合同じ番号がつく）の入力をおこなった。原則として、観察により決定した剥離番号順に入力をおこなった。なお折れた例片についても便宜的に順番をつけ直しナンバーをつけて剥離番号にしてある。

第5図は、B13ブロックの接合資料No.1の接合状況を直線で絆ばせ、ナンバーを書くように指示し作図した。さらに接合資料No.2についてはナンバーを書かないように指示し、そのほかは同様の条件で作図した。

それぞれの接合状況を見ると、ブロックの分布の中で偏った分布を示していないようである。

VI. 今後の課題

コンピューターの導入に関して、発掘調査段階からこのシステムを導入し利用できる体制を組んでいれば、よりスムーズなデーター処理ができるであろうという反省点もあげられるものの、整理段階からの利用であっても先に述べてきたように、確実に成果をあげている。しかし、本システムも完成されたものではないという認識にたってさらに技術的援助を受けて、より良いものへと改善していきたいと思う。今回は、分布図作成のために利用したが、本論でも触れたように、発掘調査現場での遺物出土地点の記録はもとより、さらには遺構図の測量面化や遺物出土状況を彌散した写真よりデジタイザによって座標変換しながら作図していくことも可能である。遺構図の図化については従来一般に測点を結ぶ線が曇くなりがちであったが現在は、測点の取りかたに左右されるもののかなり人が黒く図に近づいてきている。ここで、若干の問題点をあげさせてもららば手入力が多くなるほど少なからず抱く誤入力の不安全感、検索しやすくなるための入力記号の再検討、さらに現在は、プログラマーに援助してもらっている現状ではあるが、目的に沿ってある程度プログラミングを修正できる技術も必要、もしくは、課題もある。また、ハードの整備、ソフト開発に関わる費用の問題も現実的である。さらに、機器とどのように協調し利用するかという

研究者の目的意識の問題などもある。

ここで使用したシステムからはなれて一般的な状況を見てみると、詳細を明確には知ることではないが、同様なシステムは、近年いくつか開発されてきている。本遺跡の整理段階における分布図作成の問題も、このようなシステムの導入により解消しスムーズに作業が進行しているものの、もう一つの柱である尖頭器および現在までに接合した膨大な資料の実測については推進している。それならば遺物実測システムを考えることもできるが、土器については、成果をあげてきているが石器については、まだ問題があると思われる。

石器については小形のものを除いて複雑までは可燃だが、剥離状況を見るうえで重要なフィシャー・リングは、機械では無理で、当然人手でおこなう必要がある。また剥片剥離工程を検証するための接合作業や遺物の分類についても人が行わなければならないのである。

当然のことながら遺跡の整理をおこなうには、すべてコンピューター等を使用すれば良いというものでない。実用できることがらで、可能な限り利用する場合においても、人的処理が不可欠な整理作業を中心にして整理計画をたてる必要性を強調したい。

VII. おわりに

近年コンピューター機器の使用が、考古学の分野のなかにも急速に進展しているが、そのノリットである多量なデーターの処理と蓄積、スムーズな活用。検索等がアピールされることは事実である。しかし重要なのは、いかなる発掘調査をおこない、遺跡の復元を追求していくかという目的のために、どのようなシステムが必要になるのかという発想をもとにしたコンピューターの利用であるということである。

この必要性が種々の問題点、改善点を乗り越えて行く原動力になると信じている。

総論的には、「人があってコンピューターがある。」という一語に表される。

最後になったが、分布図作成のためのコンピューター利用について、ご指導、ご助言をいただき

ました。松沢伸生先生、南 博史氏、プログラムに關し技術的援助をいただいている京都コンピューターシステム社の西井久亮氏、林 康氏、そろに下茂内遺跡発掘調査から整理作業まで終始ご指

導、ご助言をいただいている当輝蔵文化財センター長野調査事務所の大竹憲昭氏、佐久市教育委員会の須藤隆司氏、御代田町教育委員会の堤 隆氏には、記して感謝申し上げます。

- 註1 発出されたブロックは、今後検討の余地も残されているが、大きく二つの文化層に所属すると考えている。二つの内の古いほうの文化層は、浅間山越原のテフラの直下に存在している。これについての詳説は、報告書に譲るが山見文化財研究所の河西 学氏に鑑定依頼したところ、A S-Y Pに対比されるとの結果を頂いている。さらには、その文化層からは、土器が1点出土している。この土器については、公の文書で発表をしていなかったが、多くの方々の観察結果では肉質で見るかぎり土陶であることに間違いなく、出土状況は推測等の可能性も極めて低い。この土器の評価は別として出土したことここで、公表しておきたい。
- 註2 発掘調査中の遺物取り上げから起動するシステムを使用する場合には、さらにハンドヘルドコンピューター（エプソンII C-45）、プリンター（エプソンC-40）、光波距離計（TOPCON GUPPY GTS-3）の使用を紹介されている。

- 註3 基本データーの項目については、以下のようである。

- RNo RNo (コンピューターに登録されるデーターの登録No)、地区 地区名 (小地区である2mグリッド名)、No No (2mグリッドごとの遺物取り上げNo)、枝番 枝番号 (取上げナンバーに対応する遺物は1点であることが原則であるが、複数の遺物が有する場合もあるため、他別内容を記録してある。また、枝番号の記録の欄を並ねる)、時期 時期 (遺物の時期)、需 素材 (尖頭器製作にかかる素材の取りかたの分類)、石 石材 (石質)、側1 制作番号1 (ブロックごとの石質について、複数分類しうる個体別資料分類)、側2 制作番号2 (個体番号1をもとにしたブロック間に同じように、複数分類資料)、ア ブロック (ブロック名)、遺 留存形態 (調査剥片の自然面の有無と破損状況を考慮した遺存状況)、長さ・幅・厚さ・重さ・溝曲・打抜・打面の長さ・打面・打面の幅 (これらは計測値)、持 滾曲底 (湾曲: 長さ×100の百分比によって表示)、形 制片形態 (基底分類)、打 打削影態 (打面の形態分類)、状 滾曲状況 (湾曲度からみた剥片分類)、原 原石類型 (尖頭器製作に用わる分類)、屏No 模倣番号 (この項目は、現にプログラムに入力)
- 註4 本来ならば、「30」と設定すべきであるが、あらゆる角度から見渡すために常に基準線は傾きを持たせるようにプログラミングされている。したがって、0.1mmの傾きを持たせて設定している。
- 註5 総合資料は、No1、No2とともに図示したように両側面から剝離された剥片が並んで接合している例で、村のおのの個体を全用いている。これらは、尖頭器を中心にして両側からおわれるものであろう。この製作状況と類似しているのが多摩ニュータウンNo425遺跡で報告された（佐藤1989）のチャート型の尖頭器をおおうように剥片が合したものである。下茂内遺跡の使用された原石はほとんどが豊角器と思われるが、No425遺跡についてはどのような形状の原石から剝離したのかは不明である。しかし、石碑でおこなっている様子である点、大きな素材を早い段階で尖頭器状にしている点など両者には多くの類似点が想取られる。

参考文献

- 南 博史 1986 「第1章 調査の経過と方法 第4章 発掘調査及び整理作業におけるコンピューターの利用」『長野県三岳市 汗口遺跡—北側津田岳遺跡—』開古代学協会
- 小坂 共栄他 1983 「(6)内山地域」『日本の地質4 中部地方I』日本の地質「中部地方I」編集委員会編
- 中村 山児 1989 「尖頭器の石核」『長野県考古学会誌 シンボジウム特集号 中津高瀬の尖頭器文化』59・60号
- 田村 伸也 1987 「自然科学の手法による遺跡、遺物の研究—先土器時代の石器石核の研究」『千葉県文化財センター』11』80千葉県文化財センター
- 佐藤 実行他 1989 「III 収納と遺物 1旧石器時代 3) 第1文化層」『東京都埋蔵文化財センター調査報告第10集 多摩ニュータウン遺跡 昭和62年度(第5分冊)』東京都埋蔵文化財センター
- 近藤尚哉・小林秀行他 1988 「3 発掘調査(上行道付跡事道)(1)下茂内遺跡」『長野県埋蔵文化財センター年報』5』
- 近藤尚哉・小林秀行他 1989 「2 上信越自動車道関係 (佐久調査事務所) (2)整理作業の概要」『長野県埋蔵文化財センター年報』6』

石川条里遺跡における

珪藻化石を通しての古環境復元の試み

越川 長治

I. はじめに

- II. 石川条里遺跡の地形と試料採取場所
III. 試料の処理

IV. 分析結果

V. 考察

I. はじめに

珪藻は、0.01~1mm程度の顎微鏡サイズの微小藻類であり、珪酸体よりなる丈夫な殻を持つため、化石として水成堆積物中より多産する。また、珪藻類全体としては、海水域から淡水域に亘って広く分布しているが、種類が多いため、構成が多様であること、わずかな環境の変化で容易にその構成が変わることなどから、難点もあるが、直接環境を推定できるという大きな利点がある。

そこで、珪藻の個々の種が、夫々特定の生息環境を持つという特性から、化石群集の個性解説を通して石川条里遺跡における環境の復元を試みようとするものである。

この研究を実施するにあたり、土の試料処理から、分析方法、同定手順に至るまで、信州大学教育学部地学校家の齊藤慶先生にいろいろとご教授をいただきました。また、所属する長野調査事務所の佐藤部長をはじめ、多くの先生方に多大なご協力をいただきました。記して厚く感謝いたします。

II. 石川条里遺跡の地形と

試料採取場所

石川条里遺跡は、長野盆地の南西端近くに位置し、千曲川沿いに発達した後背湿地帯にあたる。

条里遺跡は細粒の粘土、シルト及び、有機質土からなる軟弱地盤であって、所々に高まりを残しながら、南西から北東に緩やかに傾斜をした良好な水田地盤となっている。

周辺からの土砂の流れ込みが顕著に見られるのは、平安の砂層以降であって、それ以前には、西

側の山麓を除いては、あまり見られない。


平安の砂層は、西側に厚く東側に薄く堆積しており、所々に浅間山の凝灰岩を含んでいます。又、その組成は山麓の礫花崗岩の岩砂や砂質土壌のものと良く似ていること、その分級度は、1,284で良好、しかも細粒であるという特色をもって、遺跡全体に広く分布している。

分析用の試料は、この遺跡の3か所で採集した。1988年7月に、プラントオーバール分析用試料と同じ順序で採集した1~2区の北壁、(TP52)の試料12点、1988年11月、5区の張高地南側の8区の南壁で採集した試料16点、1989年10月、16区の深掘の地点で採集した試料13点である。

III. 試料の処理 (概略)

1. 湿っている試料3gを蒸留水にとり、15% HCl 30ccを加え10分間加熱して、泥化と漂白を行なう。後、蒸留水200ccを加え懸濁させ、傾斜により、岩片や砂粒を除去する。
2. 試料に再び蒸留水200ccを加え、漂浮懸滴して5時間放置後、上澄み液を捨てる。この洗浄操作を2~3回繰り返す。
3. 0.01Nビロリンサンナトリウム溶液を加え、電動遠心分離器を用いて、洗浄操作を、溶液が透明になるまで、少なくとも5回以上繰り返す。
4. こうして得られた洗浄済み試料を用いて、封入剤で封入し、プレパラートに作製する。
5. 検鏡は、200倍で珪藻の存在を確かめ、400~1000倍のもとでメカニカルステージを用いて任意に選んだ直線に沿って走査し算定した。

第1図 土層性状図からみた
石川条里遺跡の地形断面図



種の同定は、1000倍での直接検鏡と、拡大写真にもとづいて行った。

IV. 分析結果

1. 1~2 地区 (TP 59)

9 層から 20 層までの 12 試料の分析結果である。珪藻化石群集として明らかになったのは、第 1 表のように 25 層 88 種 28 变種 3 品種計 119 の分類群である。

その内訳は、*Achnanthes* 属 1 種、*Amphora* 属 1 種 1 变種、*Caloneis* 属 2 種 1 变種、*Cocconeis* 属 2 種、*Cyclotella* 属 4 種 1 变種、*Cymbella* 属 10 種、*Diploneis* 属 3 種 1 变種、*Eunotia* 属 6 種 8 变種、*Epithemia* 属 4 種 1 变種、*Fragilaria* 属 2 種、*Frustulia* 属 2 種、*Gomphonema* 属 6 種 4 变種、*Gyrosigma* 属 1 種、*Hantzschia* 属 1 種 1 品種、*Melosira* 属 1 種、*Navicula* 属 12 種 2 变種、*Neidium* 属 2 種 2 品種、*Nitzschia* 属 3 種、*Pinnularia* 属 14 種 4 变種、*Rhoicosphenia* 属 1 種、*Rhopalodia* 属 2 種、*Stauroneis* 属 4 種、*Surirella* 属 2 種 4 变種、*Synedra* 属 1 種 1 变種である。

次に土層の特徴を概観的に述べる。

水の塩分濃度の面から見ると、各層とも貨鹽一不定性種が一番多く、次いで鹹鈉種が多く出現しており、両性種で全体の 80~90% を占めている。


又鹹塩性種は *Eunotia* 属で、15~17 層と 20 層では、全体の 30~40% を占めている。

好塩性の *Rhoicosphenia curvata*、*Rhopalodia gibba* が少數ではあるが 1 層に出ていていることは、特筆される。

水質の pH の面から見ると、各層とも、真酸性~好酸性種が、真アルカリ~好アルカリ性種が夫々多を占め、残りを pH 不定性種その他の種が占めている。

従って、真アルカリ~好アルカリ性種が 40% 以上を占める 9 層、11~14 層、20 層では、好酸性種は 30% 未満で、真酸性~好酸性種が 40% 以上を占める 15~17 層では、この逆である。

15~17 層に於ける真酸性~好酸性種は、ほとんどが *Eunotia* 属でその他の種には、*Pinnularia* 属である。



第 2 図 TP 59 北型性状図

流水面から見ると、流水不定性種が各層とも 50% 以上を占め、次いで底土水~好土水性種が 10~40% を占め、両性種で 90% 以上を占めている。


好流水性種は、9~10 層にかけて極めて僅か見られたが他には、全く見られなかった。

出現した珪藻化石の保存状態を見ると、9~10 層では殆んどが細かく破壊されており、顯微鏡下に見るその数は多量であった。14 層以下からは、完全な形の化石が多く出現し、*Eunotia* 属、*Cymbella lanceolata* や *aspera* 等が優占種であった。

2. 15 区深掘地点

12 層は出現土器等から弥生時代中期の土層で、水田跡も検出されている。この地点の土層の堆積状況を見るために約 3~4 m のレンチを東西南北に入れた。採取したサンプルは、ここでの 12 層~22 層までの計 11 試料である。化石群集として明らかになったのは、第 3 表である。

その内容は、*Achnanthes* 属 4 種 1 变種、*Amphora* 属 1 種 1 变種、*Caloneis* 属 2 種、*Cocconeis* 属 1 種 1 变種、*Cyclotella* 属 2 種、不明種若干、*Cymbella* 属 14 種、*Cymatopleura* 属 1 種、*Diatoma* 属 1 種、*Diploneis* 属 3 種 1 变種、*Epithemia* 属 6 種 2 变種、*Eunotia* 属 9 種 5 变種、*Fragilaria* 属 1 種、*Frusturia* 属 2 種、*Gomphonema* 属 8 種 10 变種 1 品種、*Gyrosigma*



第3図 16区深掘地点の柱状図

属1種、*Hantzschia* 属2種1品種、*Melosira* 属3種、*Meridion* 属1種1変種、*Navicula* 属8種2変種、*Neidium* 属4種1変種1品種、*Nitzschia* 属3種、*Pinnularia* 属19種7変種3品種、*Peronia* 属1種、*Rhopalodia* 属2種、*Stauronecis* 属4種、*Stephanodiscus* 属2種、*Surirella* 属4種1変種、*Synedra* 属1種3変種1品種の計、28属110種36変種7品種である。

次に土層の特徴を概略的に述べる。

各層とも珪藻化石の保存状態は大変良好で、大型珪藻化石も、完全な形で出現した。

又、12層のプレバーラートでは、珪藻化石と一緒に、数個のイネのプランツオバールも検出されたことが特筆される。

出現した化石群集を水の塩分濃度面から見ると、貴塩-不適性種が一番多く、次いで嫌塩種が多く両種で90%位を占めている。他は不適性種で好塩性種は全く見られなかった。

嫌塩性種が50%近く占めるのは、13層と20層で出現率の顕著なのは *Eunotia* 属である。

又、流水面から見ると、流水不定性種が平均して70%以上を占め、次いで真土水-好塩性種が多く

両で90%以上を占めている。

真流水-好流水性種は、15 a、17 a、21層でおよそ全体の10%を占めている。これを土層の厚さから見ると、ほぼ同じ厚さの90cm位いで、周期的であることが特徴づけられる。

これ等の層で、真流水-好流水性種の出現顕著なのは、*Meridion* 属である。

水質の前面から見ると、13層と20層に真酸性-好酸性種のピークが見られる。出現率の顕著なのは、*Eunotia* 属である。

又、15 b、17 b～19層にかけて、真アルカリ-好アルカリ性種が60～70%にも至っているのが特徴的である。

これ等の層で顕著な出現種は、*Cymbella aspera*、*Synedra ulna* である。

3. 8区付近

8区東側のこの地区は、縄文前期の住居跡や尖底土器等が出土した縄文前期包含層や、古墳土器包含層を含む1層～15層までの計15サンプルである。

尚分析検査の層は7層～15層で、1層～6層は現在分析中である。

現在までの分析結果は、第5表である。その内容は *Achnanthes* 属1種2変種、*Amphora* 属2種1変種、*Caloneis* 属1種、*Cocconeis* 属2種、*Cyclotella* 属3種、若干の不明種、*Cymbella* 属9種1変種、*Diatoma* 属1種1変種、*Diploneis* 属3種、*Epithemia* 属3種7変種、*Eunotia* 属4種7変種1品種、*Fragilaria* 属1種、*Frustularia* 属1種、*Gomphonema* 属5種7変種、若干の不明種、*Hantzschia* 属1種1変種、*Merosira* 属3種、*Meridion* 属1種1変種、*Navicula* 属5種1変種、*Neidium* 属1種1変種、*Nitzschia* 属4種、*Pinnularia* 属10種8変種、*Rhoicosphenia* 属1種、*Rhopalodia* 属2種、*Stauronecis* 属2種、*Synedra* 属2種3変種、*Stephanodiscus* 属の不明種若干の計25属67種41変種1品種と、若干の不明種である。

次に土層の特徴を概略的に述べる。

縄文前期の包含層の13～15層は極めて貧乏藻帶である。*Epithemia turugida*、*Hantzschia amphioxys* が合計して数個出現しているのが主で、他は1～2個である。

| | 明褐色10YR3/3 | 現耕作土 |
|--------|----------------|--------------------------------------|
| 2-1 | 褐色10YR4/4 | 砂質粘土FeO ₃ 無機 古墳時代土器包含層 |
| 2-2 | にふい黄褐色10YR5/4 | 砂質粘土MnO ₂ 無機 |
| 3 | 黄褐色10YR5/8 | 砂混じりの粘土FeO ₃ 無機が多い |
| 356.00 | 褐色10YR4/4 | 砂をやを感じる粘土 |
| 4-1 | 暗褐色10YR3/3 | 砂をやを感じる粘土 |
| 4-2 | 褐色7.5YR4/6 | 粘土 |
| 5-1 | にふい黄褐色7.5YR5/4 | 粘土 |
| 5-2 | 暗褐色7.5YR3/3 | 粘土、灰白色無機がある |
| 5-3 | 褐色7.5YR3/2 | 粘土、白灰色無機がある |
| 5-4 | 褐色7.5YR4/3 | 粘土、灰白色無機がある |
| 5-5 | 暗褐色7.5YR2/2 | 粘土 |
| 5-6 | 灰褐色7.5YR5/2 | 粘土 |
| 5-7 | 褐色7.5YR3/3 | 粘土 |
| 5-8 | 褐色7.5YR6/1 | 粘土、白色斑駁がある |
| 5-9 | 灰褐色7.5YR4/2 | シルトが混在している |
| 5-10 | 褐色7.5YR4/1 | シルト、縄文時代前土器包含層 |
| 5-11 | 褐色10YR4/1 | シルト |
| 354.00 | | |
| | | き層名を試料番号とする |

第4図 3区南壁柱状圖

これに比して7~8層、11~12層には、出現数が多い。9~10層はやや少ないが、縄文前期包含層に比して、幾つか4倍以上の出現数がある。

出現珪藻化石群集を、水の塩分濃度面から見ると、貧塩-不定性種が一番多く、次に嫌塩性種で、両種で80%を占めている。

又数%ではあるが、好塩性種が、各層に出没していることは特筆される。

流水面から見ると、80%近くが、流水不定性種と、真正水-好止水性種で占めている。好流水性種は、各層で数%を占めている。

水質の出面から見ると、真アルカリ-好アルカリ性種と、ぬ不定性種が50~70%余を占めている。

真酸性-好酸性種が多いのは、7層と11~12層で約30%を占めている。

この層での出現数の多いのは、Eunotia属、Syndra属と、Epithemia turugidaである。

V. 考察

1 流水に対する珪藻化石群の適応性はどこも、流水不定性種が一番多く、真正水-好止水性種の分類群がほとんどである。

このことから、石川条里遺跡は千曲川の後背

湿地帯内にあり、湿地としてほとんど流水の見られなかった、比較的穏やかな止水環境にあった。

しかし、16区の15a、17a、21の各層で見られる好流水性種群の変動から、縄文時代には、周期的に流水にあい冠水した。このことは、自然堤防の形成と何等かの関係があるように思われる。

また、8区東側の13~15層は、縄文前期包含層で、冠水で無機砂もしくはシルトで厚く覆われている。後に湿地植物が繁茂し、再び壁上化したのは、弥生-古墳時代になってからである。

2 珪藻の塩分濃度に対する適応性は、どの地点の、どの土層においても、貧塩-不定性種もしくは、嫌塩性種が8割以上と多い。

このことから、この地は淡水のきれいな水域であった。然し、好塩性種が見られた8区は、住居跡の発掘されている近くなので、排水等による汚染が考えられる。

3 硅藻化石群の出に対する適応性から、水域環境は大きく2分される。

即ち、1~2区では、13層(弥生後期-古墳)以降、16区では12層(弥生中期)以降、淡水のアルカリ水域環境が続いていた。

これは湿地植物の減少によるもので、「ヨシ属の繁茂する湿地帯が調整され、水田が造成されヨシが激減した。」という、プラント、オペール分析調査報告書とも一致する。

他方、それら以前は、特に、真酸性-好酸性種群の変化が大きいことから、淡水のアルカリ性水域ではあったと言えるが、植物の腐殖酸に起因する弱酸性の原因となった草炭性湿原が、冠水によって減少したり、再び繁茂したりする繰り返しの変化に富んだ環境であった。

このことは、16区の真流水-好流水性種群が見られる15a、17a、21の各層が、冠水の繰り返しによって形成されたものであり、その部都植物が減少したり、繁茂したりしたことが、この地点の土層觀察からもわかる。

4 珪藻化石の保存状態から考えると、1-2区の保存状態特に悪かった9-10層は、水田耕作の乾田化等のため、しばしば乾燥するような環境にあって、破壊されたものと思われる。

その他の土層に於ては、保存状態がよく、大型の化石も完全な形で出現した。

これは、海岸帯としての穏やかな水域環境が

続いたためと推定される。

5 1-2区の最深部の20層は、西側山地の岩峰の急激な流れ込みに起因する貧珪藻帶である。

又、8区の13-15層は、急激な冠水による細粒砂もしくはシルトにより厚く覆われたことによる貧珪藻帶である。

参考文献

- 1 「Bacillariophyta (Diatomeae)」 Dr. Friedrich Hussadt (Bremen)
- 2 「The Diatoms of the United States Vol. 1.」 Patrick Reimer
- 3 「The Diatom of the United States Vol. 2. Part 2.」 Patrick Reimer
- 4 「野尻湖の発掘3、4」 地学同好研究会
- 5 「諏訪市史」 調査報告書17集 自然編
- 6 「H高濃跡 1982」 諏島県教育委員会
- 7 「龜井北 その1、2」 大阪府教育委員会
- 8 「日本淡水プランクトン図鑑」 保育社
- 9 「珪藻化石群集による古奥東京湾の底分級度の推定」 小林正人
- 10 「プラント・オバール分析調査報告書」 古環境研究所

第1表 石川県里浜跡1-2地区の珪藻フローラ

| No. | species name | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Achnanthes dispar Cleve | | | | | | | | | 22 | 23 | 8 | | | |
| 2 | Amphora ovalis Kutz | | 22 | 1 | 5 | 30 | 6 | | | | | 4 | | | |
| 3 | var. affinis | | 15 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Caloneis Schroederi Hust. | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 5 | schumanniana var. bicostriata | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
| 6 | silicula Cleve | 4 | | 8 | 5 | 15 | | | | | | | | | |
| 7 | Cocconeis placentula Ehr. | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 8 | diminuta Pant | | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | |
| 9 | Cyclotella comta Kutz | | | | 4 | | | | | | | 1 | | | |
| 10 | Kutzningiana var. planctophora | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 11 | ocellata Pantocsek | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | |
| 12 | stelligera Cl. | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Cymbella aequalis Smith | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | affinis kutz | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 15 | aspera Cleve | | | | | | 14 | | | | 4 | | | | |
| 16 | cuspidata Kutz | 3 | 19 | 8 | 4 | 3 | | | | | | | | | |
| 17 | Ensenbergii kutz | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 18 | gracilis Cleve | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | |
| 19 | laevisolata Ehr. | | 5 | | 3 | 12 | | 11 | 19 | 16 | 46 | 20 | | | |
| 20 | tenuida Grun | | | 4 | | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | | | | | |
| 21 | turgida Cleve | 7 | 10 | 5 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 22 | turgidula Cleve | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Diploneis elliptica Cleve | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 24 | fimicina | | | 4 | | | 5 | | | | | | 2 | | |
| 25 | ovalis Cleve | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| 26 | smithii var. dilatata | 37 | | | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8 | 4 | | | |
| 27 | Eunotia arcus var. bidens Grunow | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 28 | lunaris Grun. | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | pectinalis Kutz. | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 2 | 7 | 6 | 4 | | |
| 30 | var. minor | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 31 | var. undulata | | 3 | | 1 | 9 | 17 | 38 | 60 | 39 | 5 | 10 | 4 | | |
| 32 | var. ventralis | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | | | |
| 33 | sp. | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 34 | polyglyphis | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 35 | praerupta EHR. | | | | | | | 6 | | 3 | 3 | | | | |
| 36 | var. bidens | | | | 1 | | | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | | |
| 37 | var. inflata | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | |
| 38 | tenella Hustvedt | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | telox var. gracillima | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 40 | trisacria var. undulata | | | | | | | 23 | 3 | | | | | | |
| 41 | Eunotia valida | | | | | | | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|
| 42 | Raphidomela argus var. longuornis | | | | 1 | | | | | | |
| 43 | hyndmanii W SMITH | | | 3 | | 2 | | 1 | | | |
| 44 | ocellata kutz. | | | | | 1 | | | | | |
| 45 | rugosa kutz. | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
| 46 | zebra kutz. | | 1 | | | 5 | | | | | |
| 47 | Fragilaria brevistriata | | | | | | | | | | |
| 48 | virescens Ruff. | | | | | | | 1 | | | |
| 49 | Frustulia rhomboides | 1 | | | | | | | | | |
| 50 | vulgaris THWAITES. | | | | 3 | | 5 | | | | |
| 51 | Gomphonema acuminatum Ehr. | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 52 | var. pusilla | | 8 | | | | | | | | |
| 53 | angustatum Rabh. | | | | | 13 | | | | | |
| 54 | augur Ehr. | 2 | | | | | 1 | | | | |
| 55 | constrictum var. capitata | 2 | | | 1 | | | | | | |
| 56 | var. turvis Cleve. | 9 | | | 2 | | | 1 | | | |
| 56 | gracile Ehr. | 2 | | | 1 | | 1 | | 3 | 11 | |
| 57 | longiceps var. subclavata | 2 | | | | 4 | 3 | 2 | 2 | | |
| 58 | sumatrense | 6 | | | | | | | | | |
| 60 | truncatum Ehr. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 61 | Gyrosigma acuminatum Rabh. | 1 | 3 | | 3 | | | | | | |
| 62 | Hantzschia amphioxys Grun. | 5 | 10 | | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 5 |
| 63 | fo capitata | | | | | | | | | | 2 |
| 64 | Melosira distans kutz. | | | | | | | 6 | 1 | 10 | |
| 65 | Navicula americana | | | | | | 1 | | | | |
| 66 | var. moesta | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 67 | bacillum Rhr. | | 15 | | | | | | | | |
| 68 | binodis Ehr. | | | | | | | 2 | | | |
| 69 | cuspidata kutz. | 2 | 8 | | 2 | 5 | | | | | |
| 70 | gotlandica | | 5 | | | | | | | | |
| 71 | lanceolata | | | | | | 49 | 4 | 14 | 4 | |
| 72 | menisculus Schumann. | | 2 | | | | | | | | |
| 73 | matica kutz. | | | | 1 | | | | | | |
| 74 | pupula var. aqueductae | | 82 | | | | | | | | |
| 75 | pygmaea kutz. | | 8 | | | | | | | | |
| 76 | Reinhardti Grun. | 3 | | 15 | 7 | 7 | | | 4 | 6 | |
| 77 | rostellata kutz. | | | 15 | | | | | | | |
| 78 | tuscula Grun. | | 6 | | 21 | 1 | | | 1 | | |
| 79 | eidium dubium fo. constricta | | | | 6 | | | | | | |
| 80 | iridis Cleve. | | | 11 | 4 | 6 | | | 1 | | |
| 81 | Neidium iridis fo. vernalis | | | 5 | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 82 | tamperi Reim. | | 17 | 18 | 4 | | | | | | 5 |
| 83 | Nitzschia frustulum kutz. | | | | | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 84 | <i>lineares</i> Hust. | | | | | | 2 | | | | | | |
| 85 | sp | | | 1 | 25 | | 4 | | | | | | |
| 86 | <i>thermalis</i> Kutz | | | | 4 | | 5 | | | | | | |
| 87 | <i>Pinnularia appendiculata</i> Cleve | | | | | | | 1 | | | | | |
| 88 | <i>acrosphaeris</i> | 1 | | 5 | | | 2 | 1 | | | | | |
| 89 | <i>borealis</i> var. <i>brevicostata</i> | | | | | | 1 | | | | | | |
| 90 | <i>cardinalis</i> W. Smith | | 9 | 12 | 2 | 13 | | | | | | | |
| 91 | <i>dactylus</i> Ehr. | 19 | 7 | 14 | 17 | | 35 | 26 | 43 | 17 | | | |
| 92 | <i>episcopalis</i> Cleve | | | | | | | | 2 | | | | |
| 93 | <i>gibbar</i> Ehr. | 20 | 2 | | 3 | 3 | | 15 | 7 | 2 | | | |
| 94 | var. <i>linearis</i> | | | | | | | | 5 | | | | |
| 95 | var. <i>parva</i> Grunow | 4 | | | 3 | | | 13 | 1 | | | | |
| 96 | <i>ueno</i> Skvortzov | | | 1 | | | | | | | | | |
| 97 | <i>maior</i> Kutz | 3 | 19 | 8 | 22 | 5 | 33 | 18 | 2 | 1 | | | |
| 98 | <i>mesolepta</i> W. Smith | 1 | 5 | | | | | | | | | | |
| 99 | <i>microtauron</i> Cleve | | | 5 | | 4 | | | 4 | | | | |
| 100 | <i>molaris</i> Grunow | | | | | | 2 | | | | | | |
| 101 | <i>nobilis</i> Ehr. | | | | 2 | | | | 4 | 5 | | | |
| 102 | <i>subsoialis</i> Cleve | 1 | | | | | | | | | | | |
| 103 | <i>viridis</i> Ehr. | | 7 | 3 | 11 | 50 | | 2 | 50 | 11 | | | |
| 104 | var. <i>sudetica</i> | | 2 | | | 8 | 19 | | | | | | |
| 105 | <i>Rheicospheria curvata</i> | | | | | | | 1 | | | | | |
| 106 | <i>Rheopalodia gibba</i> | | 10 | | | | | | 1 | | | | |
| 107 | <i>gibberula</i> | 1 | 8 | | | | | | | | | | |
| 108 | <i>Stauroneis acuta</i> W. SMITH | | | | 5 | 6 | 3 | 8 | 34 | 22 | | | |
| 109 | <i>anceps</i> Ehr. | | 8 | 2 | 9 | | | | | | | | |
| 110 | <i>phoenicenteron</i> | 11 | 46 | 16 | 6 | 13 | | | 9 | 12 | | | |
| 111 | <i>schroederi</i> Hust. | | | | | | 2 | | | | | | |
| 112 | <i>Stephanodiscus astraea</i> Grunow | | | | 1 | | | | | | | | |
| 113 | <i>Surirella biseriata</i> var. <i>constricta</i> | 5 | | | | 1 | | | | | | | |
| 114 | <i>elegans</i> Ehr. | | | | 1 | | | | | | | | |
| 115 | <i>linearis</i> var. <i>helvetica</i> | | 3 | | | | | | | | | | |
| 116 | var. <i>constricta</i> | | | | | 1 | 3 | | | | | | |
| 117 | <i>robusta</i> | | | | | | | | 2 | | | | |
| 118 | var. <i>spendida</i> | | | | | | | | | 3 | | | |
| 119 | <i>Synedra ulna</i> Ehr. | | | | 6 | 4 | 4 | | 3 | | | | |
| 120 | var. <i>aqualis</i> | | 2 | | | 2 | 4 | | | | | | |
| 合計 | | 48 | 485 | 116 | 115 | 242 | 111 | 203 | 204 | 178 | 336 | 208 | 50 |

第2表 石川条里遺跡1-2地区の珪藻の生態性

| No. | species name | 合計 | 塩分濃度 | pH | 流水 |
|-----|----------------------------------|-----|-------|-------|-----|
| 1 | Achnanthes dispar Cleve | 63 | | | |
| 2 | Amphora ovalis Kutz | 68 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 3 | var. affinis | 33 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 4 | Caloneis Schroederi Hust. | 5 | | | |
| 5 | schumanniana var. biconstricta | 2 | | | |
| 6 | silicula Cleve | 32 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 7 | Cocconeis placentula Ehr. | 5 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 8 | diminuta Pant | 7 | 貧塩-不定 | 真アルカリ | 不定 |
| 9 | Cyclotella comata Kutz | 5 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 好止水 |
| 10 | Kutzingiana var. planetophora | 7 | | | |
| 11 | ocellata Pantocsek | 5 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 真止水 |
| 12 | stelligera Cl. | 1 | 貧塩-不定 | | 真止水 |
| 13 | Cymbella aegualis Smith | 3 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 好止水 |
| 14 | affinis Kutz | 6 | 貧塩-不定 | 真アルカリ | 好止水 |
| 15 | aspera Cleve | 18 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 16 | cuspidata Kutz | 37 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 17 | Ehrenbergii Kutz | 1 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 真止水 |
| 18 | gracilis Cleve | 4 | 貧塩-不定 | 不定 | 好止水 |
| 19 | lanceolata Ehr. | 126 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 真止水 |
| 20 | tumida Grun | 18 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 21 | turgida Cleve | 24 | 貧塩-不定 | 真アルカリ | 真止水 |
| 22 | turgidula Cleve | 1 | 貧塩-不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 23 | Diploneis elliptica Cleve | 1 | | | |
| 24 | finica | 11 | 貧塩-不定 | 不 定 | 好止水 |
| 25 | ovalis Cleve | 3 | 貧塩-不定 | 不 定 | 不 定 |
| 26 | smithii var. dilatata | 83 | 貧塩-不定 | 不 定 | 不 定 |
| 27 | Eunotia arcus var. bidens Grunow | 4 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 28 | lunaris Grun. | 6 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 29 | pectinalis Kutz. | 23 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 30 | var. minor | 3 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 31 | var. undulata | 186 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 32 | var. ventralis | 16 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 33 | sp. | 5 | | | |
| 34 | polyglyphis | 2 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 35 | praerupta EHR. | 12 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 36 | var. bidens | 28 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 37 | var. inflata | 5 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 38 | tenella Hustede | 2 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | |
| 39 | taillor var. gracillima | 2 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 40 | trimacria var. undulata | 26 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 41 | Eunotia valida | 2 | 貧塩-緑藻 | 好 酸 性 | |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|
| 42 | <i>Epileptenia argus</i> var. <i>longuornis</i> | 1 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 好止水 |
| 43 | <i>hyndmanni</i> W.SMITH | 5 | | | |
| 44 | <i>ocellata</i> Kutz. | 1 | | | |
| 45 | <i>trigida</i> Kutz. | 21 | 貧塩～鹽塩 | 好アルカリ | 好止水 |
| 46 | <i>zebra</i> Kutz. | 6 | 貧塩～鹽塩 | 好アルカリ | 不走 |
| 47 | <i>Fragilaria brevistriata</i> | 1 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 48 | <i>virescens</i> Rulfs. | 1 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 49 | <i>Frustulia rhomboides</i> | 1 | 貧塩～鹽塩 | 好酸性 | 好止水 |
| 50 | <i>volgaris</i> THWAITES | 8 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 51 | <i>Gomphonema acuminatum</i> Ehr. | 3 | 貧塩～不定 | 不定 | 好止水 |
| 52 | var. <i>pusilla</i> | 8 | | | |
| 53 | <i>angustatum</i> Rabh. | 13 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 54 | <i>angustum</i> Ehr. | 3 | 貧塩～不定 | | 不定 |
| 55 | <i>constrictum</i> var. <i>capitata</i> | 3 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 56 | var. <i>turnirii</i> Cleve. | 12 | 貧塩～不定 | 不定 | 好止水 |
| 57 | <i>gracile</i> Ehr. | 18 | 貧塩～不定 | 不定 | 好止水 |
| 58 | <i>longiceps</i> var. <i>subclavata</i> | 13 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | |
| 59 | <i>sumatrense</i> | 6 | | | |
| 60 | <i>truncatum</i> Bhr. | 7 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 61 | <i>Gyrosigma acuminatum</i> Rabh | 7 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 好流水 |
| 62 | <i>Hantzschia amphioxys</i> Grun. | 58 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 63 | <i>fo capitata</i> | 2 | 貧塩～小堀 | 好アルカリ | 不定 |
| 64 | <i>Melosira distans</i> Kutz. | 17 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 65 | <i>Navicula americana</i> | 1 | | | |
| 66 | var. <i>moesta</i> | 2 | | | |
| 67 | <i>bacillum</i> Ehr. | 15 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 68 | <i>binodis</i> Ehr. | 2 | | | |
| 69 | <i>cuspidata</i> Kutz. | 17 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 70 | <i>gottlandica</i> | 5 | | | |
| 71 | <i>lanceolata</i> | 71 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 真止水 |
| 72 | <i>meissnica</i> Schumann | 2 | | | |
| 73 | <i>mixta</i> Kutz. | 1 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 74 | <i>papula</i> var. <i>sphaerula</i> | 82 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 75 | <i>pygmaea</i> Kutz. | 8 | | | |
| 76 | <i>Reinhardti</i> Grun. | 43 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 77 | <i>rostellata</i> Kutz. | 15 | | | |
| 78 | <i>tuscula</i> Grun. | 29 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 好止水 |
| 79 | <i>Neidium dubium</i> fo. <i>constricta</i> | 6 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 80 | <i>iridis</i> Cleve. | 22 | 貧塩～鹽塩 | 不定 | 真止水 |
| 81 | <i>Neidium iridis</i> fo. <i>vernalis</i> | 14 | 貧塩～鹽塩 | 不定 | 真止水 |
| 82 | <i>tamperei</i> Reim. | 39 | | | |
| 83 | <i>Nitzschia frustulum</i> Kutz | 2 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----|
| 84 | <i>lineares</i> Hust. | 2 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 真流水 |
| 85 | sp | 30 | | | |
| 86 | <i>thermalis</i> Kutz. | 9 | | | |
| 87 | <i>Pinnularia appendiculata</i> Cleve | 1 | | 好酸性 | |
| 88 | <i>acrosphaeria</i> | 9 | 貧塩～鈉塩 | 好鹼性 | 好止水 |
| 89 | <i>borealis brevicostata</i> | 1 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 90 | <i>cardinalis</i> W.Smith | 36 | | | |
| 91 | <i>dactylus</i> Ehr. | 174 | 貧塩～不定 | 好酸性 | 不定 |
| 92 | <i>episcopalis</i> Cleve | 2 | | | |
| 93 | <i>gibbar</i> Ehr. | 52 | 貧塩～不定 | 好酸性 | 不定 |
| 94 | var <i>linearis</i> | 5 | 貧塩～鈉塩 | 好酸性 | 不定 |
| 95 | var <i>parva</i> Grunow | 21 | 貧塩～不定種 | 好酸性 | 不定種 |
| 96 | ueno Skvortzov | 1 | | | |
| 97 | <i>major</i> Kutz. | 121 | 貧塩～不定 | 好酸性 | 真止水 |
| 98 | <i>mesolepta</i> W.Smith | 6 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 99 | <i>microstauron</i> Cleve | 13 | 貧塩～不定 | 好酸性 | 不定 |
| 100 | <i>molaris</i> Grunow | 2 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 101 | <i>nobilis</i> Ehr. | 11 | | | |
| 102 | <i>subsolaris</i> Cleve | 1 | | | |
| 103 | <i>viridis</i> Ehr. | 135 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 104 | var <i>sudetica</i> | 29 | 貧塩～不定種 | 不定 | 不定種 |
| 105 | <i>Rhoicosphenia curvata</i> | 7 | 貧塩～好塩 | 好アルカリ | 不定 |
| 106 | <i>Rhopalodia gibba</i> | 11 | 貧塩～好塩 | 好アルカリ | 不定 |
| 107 | <i>gibberula</i> | 9 | 弱中塩 | 好アルカリ | 不定 |
| 108 | <i>Stauroneis acuta</i> W.SMITH | 84 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 109 | <i>anceps</i> Ehr. | 19 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 110 | <i>phoenicenteron</i> | 115 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 111 | <i>schroederi</i> Hust. | 2 | | | |
| 112 | <i>Stephanodiscus astraca</i> Grunow | 7 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 好止水 |
| 113 | <i>Surirella biseriata</i> var. <i>constricta</i> | 6 | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 114 | <i>elegans</i> Ehr. | 1 | | | |
| 115 | <i>linearis</i> var. <i>helvetica</i> | 3 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 好止水 |
| 116 | var. <i>constricta</i> | 4 | | | |
| 117 | <i>robusta</i> | 2 | 貧塩～鈉塩 | 不定 | 真止水 |
| 118 | var. <i>spendida</i> | 3 | | | |
| 119 | <i>Synedra ulna</i> Ehr. | 17 | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 120 | var. <i>aequalis</i> | 8 | | | |

第3表 石川糸置遺跡II区溝槽の地層フローラ

| No. | species name | 12 | 13 | 14 | 15a | 15b | 16 | 17a | 17b | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-----|------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | <i>Achnanthes brevipes</i> Agardh | | | | | 14 | | | | | 1 | | | | |
| 2 | <i>var intermedia</i> | | | | | | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | | |
| 3 | <i>coccinea</i> var <i>brevistrigata</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <i>Inflata</i> Kutz | 1 | 12 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 5 | <i>linearis</i> | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 6 | <i>Amphora ovalis</i> Kutz | 7 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | | | 6 |
| 7 | <i>var affinis</i> | 4 | | | 5 | | | 1 | 3 | | 2 | | 1 | | |
| 8 | <i>Caloneis silicula</i> Cleve | 23 | | 3 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | <i>Schroederi</i> Hust. | | 2 | | 2 | 2 | 6 | | | | | | | | |
| 10 | <i>Coccozella placentula</i> Ehr. | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | |
| 11 | <i>var klinoraphila</i> Geitier | | | | | | | | | | | 11 | 2 | | |
| 12 | <i>Cyclotella ocellata</i> Kutz | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | |
| 13 | <i>stelligera</i> Cleve | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 14 | sp | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 5 | | | |
| 15 | <i>Cymbella aequalis</i> Smith | | | 6 | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | <i>affinis</i> | | | 1 | | | 1 | 2 | 8 | 8 | | | 13 | 8 | |
| 17 | <i>aspera</i> | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 10 | 20 | 18 | 4 | | 5 | |
| 18 | <i>cistula</i> Grun. | | | | | 1 | | | 1 | 5 | | 2 | | 3 | |
| 19 | <i>cuspidata</i> Kutz | 8 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 20 | <i>cymbiformis</i> | 1 | | | | | | | 2 | 7 | | | | 2 | |
| 21 | <i>Ehrenbergia</i> Kutz | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| 22 | <i>helvetica</i> Kutz | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | |
| 23 | <i>lanceolata</i> Ehr. | 3 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 28 | 7 | | | | |
| 24 | <i>parva</i> Cleve | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 25 | <i>tunicata</i> Heurck | | 7 | 14 | 4 | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | | |
| 26 | <i>turgida</i> | | | 4 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 27 | <i>turgidula</i> | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 28 | <i>ventricosa</i> Kutz | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 29 | <i>Cymatopleura solea</i> W. Smith | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 30 | <i>Diatoma vulgare</i> var <i>brevis</i> | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 31 | <i>Diploneis elliptica</i> Cleve | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 32 | <i>interrupta</i> Cleve | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 33 | <i>ovalis</i> Cleve | 4 | | 2 | 16 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | |
| 34 | <i>var ovlongella</i> Cleve | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 35 | <i>Epithemia argus</i> Kutz | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | 2 |
| 36 | <i>Hyndmanni</i> W. Smith | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 37 | <i>intermedia</i> Fricke | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 38 | <i>sorex</i> Kutz | 5 | 1 | | | 3 | | | | | | 2 | 2 | | |
| 39 | <i>turgida</i> Kutz | 3 | 2 | 17 | 4 | 9 | | 6 | | 11 | | 15 | 14 | | |
| 40 | <i>var granulata</i> Grun. | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 41 | <i>zebra</i> Kutz | | | | | | | | 6 | | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 42 | var porcellus | | | | 3 | | 8 | | |
| 43 | Eunotia arcus Ehr. | | | | 14 | | 1 | | |
| 44 | diodon Eh. | | | | | | | 3 | |
| 45 | gracilis Gab. | | | | | | 9 | | |
| 46 | paludosa Grn. | | | | 1 | | | | |
| 47 | pectinalis Kutz | 4 | 7 | | 1 | 2 | | | |
| 48 | var minor | 4 | 5 | 1 | | 12 | 3 | 8 | 4 |
| 49 | var undulata | 11 | 3 | 5 | 5 | 18 | 6 | 12 | 26 |
| 50 | var ventralis | | | | | | 2 | 7 | 2 |
| 51 | pracrupia | | | | | | | | 1 |
| 52 | var bidentata | 7 | | | 1 | | 8 | 1 | |
| 53 | sudetica | | | | | | | 1 | |
| 54 | var bidentata | | | | | | 2 | | 2 |
| 55 | valida Hustedt | 2 | | | 2 | 7 | 5 | | 6 |
| 56 | veneria O.Muller | | | | | | | 12 | |
| 57 | Fragilaria lapponica Grunow | | | | | | | 1 | |
| 58 | Frustularia rhomboidea Ehr. | 4 | | | | | 1 | 1 | |
| 59 | vulgaris | | | | 3 | 3 | | | |
| 60 | Gomphonema acuminatum Ehr. | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 |
| 61 | var coronata | | | | 1 | | 6 | 2 | 1 |
| 62 | var turris | 1 | | | | | | | 1 |
| 63 | var trigonocephala | | | | | | | | 1 |
| 64 | angustatum Rabb. | 1 | | | | | | 3 | |
| 65 | augur | | | | | 1 | | | |
| 66 | brebissonii | | | | | 1 | | | |
| 67 | constrictum Ehr. | | | | 2 | | 1 | | 1 |
| 68 | var turris | | | | | 3 | | | |
| 69 | gracile var lanceolata | | | | | 1 | | | |
| 70 | intricatum var pumila | | | | | | 14 | 9 | |
| 71 | longiceps var montana | 1 | | | 1 | 2 | | | |
| 72 | var subclavata | | | | 16 | | | | 1 |
| 73 | fo gracilis | | | | 4 | | | 2 | |
| 74 | parvulum Kutz | | | | 12 | | | | |
| 75 | olivaceum Kutz | | | | 2 | | | | |
| 76 | subclavatum | | 11 | | 1 | 10 | | | |
| 77 | truncatum | 2 | | | | | | | |
| 78 | var turgidum | | | | | 1 | | | |
| 79 | Gyrosigma acuminatum | 15 | | | | 7 | | 1 | |
| 80 | hantzschii amphioxys Grun. | 1 | 16 | 27 | 19 | 8 | 10 | 7 | 4 |
| 81 | Hantzschia amphioxys fo capitata | | 1 | | | | | | |
| 82 | elongata Grun. | | | | 17 | | | | |
| 83 | Merosella granulata Ehr. | | | | | | 1 | 5 | 11 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|---|----|
| 84 | island : ca O.Mull | | | | | | | | 2 | | |
| 85 | italica Kutz | | | | | | | | 17 | | |
| 86 | Meridion circulare Agardh | | | | | 3 | | 3 | | | |
| 87 | var constricta | | 4 | 13 | 3 | 15 | 17 | 5 | 3 | 4 | 26 |
| 88 | Navicula bacillum Ehr. | 5 | | | | | | 2 | 1 | | 1 |
| 89 | var Gregoryana | 1 | | | | | | | | | |
| 90 | cuspidata Kutz | 1 | | | | | | | | | |
| 91 | hasta Paa | | | 1 | | | | | | | |
| 92 | lanceolata Kutz | | | | | | | | | | 1 |
| 93 | paregrina Kutz | | | | | | | | 2 | | |
| 94 | placentula Grun | 2 | | | | | | | | | |
| 95 | pupillae Kutz | | | | 3 | 1 | | | 1 | | |
| 96 | var rectangularis | | | | | | | | | | 1 |
| 97 | radiosa Kutz | 3 | | | | | 11 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 98 | Neidium affin Cleve | 4 | | | 3 | 1 | | | | | |
| 99 | dubium Cleve | 8 | | | | | | | | | |
| 100 | var constricta | 4 | | | | | | | | | |
| 101 | iridis Cleve | 3 | | 4 | | | | | | | |
| 102 | fo vernalis | 8 | 2 | | 11 | | 5 | | | | |
| 103 | temperata Rehm | 2 | | | | | | | | | |
| 104 | Nitriaea Uncaria W.Smith | | 2 | 6 | | 4 | | | | | |
| 105 | obtusa W.Smith | | 1 | | | | | | | | |
| 106 | recta Hantzsch | | | 5 | 4 | | | | | | |
| 107 | Pinnularia acrosphaeria | | 2 | | | | | | | | |
| 108 | acuminatæ var bielawskii | | 6 | 6 | 11 | 1 | 20 | 4 | | 2 | 2 |
| 109 | borealis Ehr. | | | | | | | | | | 1 |
| 110 | Braunii var amphicephala | 2 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 111 | brevicostata Cleve | 2 | 1 | | | 23 | | | | | |
| 112 | divergens W.Smith | 1 | | | | 2 | 2 | | | | |
| 113 | var elliptica | | 2 | 5 | | | | | | | |
| 114 | dactylus Ehr. | | 4 | | | | | 2 | | 1 | |
| 115 | episcopalis Cleve | | 1 | 2 | | | | | | | |
| 116 | esox Ehr. | | | 7 | 16 | 1 | | | 1 | | |
| 117 | gentilis Cleve | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 118 | gibba Ehr. | | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | 3 | 10 |
| 119 | var linearis | | 4 | | | | 12 | 1 | | | 4 |
| 120 | fo subundulata | 2 | | 4 | 8 | | | | 1 | | |
| 121 | Pinnularia gibba var. parva | | | | 3 | | | | 1 | 3 | |
| 122 | interrupata fo minutissima | | | | 3 | | | | | | |
| 123 | legumen Ehr. | | | | | | | | | 5 | 1 |
| 124 | macilenta Cleve | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 125 | major Kutz | 12 | 1 | | | | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 126 | <i>mesolepia</i> W. Smith. | | 4 | 4 | | | 6 | 5 | 2 | | 1 | | | |
| 127 | <i>fo angusta</i> Cleve | | | | | | | | | | | 13 | | |
| 128 | <i>microstaurona</i> Cleve. | | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | 5 | | |
| 129 | <i>nobilis</i> Ehr. | | | | | | | | | | 1 | 3 | | |
| 130 | <i>pureva</i> Cleve | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 131 | <i>stomatophora</i> Grunow | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 132 | <i>subsolaris</i> Cleve. | | | | | | 7 | 1 | | 5 | | 11 | | |
| 133 | <i>viridis</i> Ehr. | 28 | 8 | 29 | 13 | 7 | 20 | 5 | 6 | 11 | 6 | | 1 | |
| 134 | var <i>minor</i> | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 |
| 135 | var. <i>sudetica</i> | 9 | | 5 | 19 | 1 | 32 | 3 | | | 6 | 1 | | 5 |
| 136 | <i>Peronia erinacea</i> | | | | | | | 2 | | | | | 4 | |
| 137 | <i>Rhopalodia gibba</i> O.Mull | 10 | 4 | 1 | | | | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 |
| 138 | <i>gliberula</i> O.Mull | | | | | | | | | | 14 | 1 | 4 | 5 |
| 139 | <i>Stauroeis acuta</i> W. Smith | | | 3 | 5 | | | 4 | | 1 | 2 | | | |
| 140 | <i>alabamae</i> Heiden | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 141 | <i>anceps</i> Ehr. | 4 | | 2 | | | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | | | |
| 142 | <i>phoenicenteron</i> Ehr. | 30 | 1 | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | |
| 143 | <i>Stephanodiscus astraea</i> Grun | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 144 | <i>carcoenensis</i> Grun | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 145 | <i>Surirella biserrata</i> | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 146 | <i>elegans</i> Ehr | 5 | 5 | 9 | 5 | | | | | | | | | |
| 147 | <i>linearis</i> var <i>constricta</i> | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 148 | <i>robusta</i> Ehr | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 149 | <i>tenuera</i> W. Smith | | 2 | | | | | | | 2 | 3 | | | |
| 150 | <i>Synedra affinis</i> var <i>fasciculata</i> | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 151 | <i>ala</i> Ehr. | 1 | 9 | 9 | 13 | 90 | 1 | 7 | 22 | 17 | 2 | 17 | 11 | 24 |
| 152 | var <i>biceps</i> Kutz | 2 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 153 | <i>fo constricta</i> | | | 1 | | 5 | | | | | | | | |
| 154 | <i>var Ramesi</i> | | | | | | | | | | | | 5 | |
| | 合計 | 240 | 185 | 221 | 225 | 192 | 182 | 200 | 140 | 215 | 164 | 209 | 221 | 202 |

第4表 石川県糸魚川市深堀の生長性

| No. | species name | 合計 | 塩分濃度 | pH | 流水 |
|-----|---------------------------------------------|-----|--------|--------|------|
| 1 | <i>Achnanthes brevipes</i> Agardh | 15 | | | |
| 2 | var <i>intermedia</i> | 20 | | | |
| 3 | <i>conspicua</i> var <i>brevistriata</i> | 1 | | | |
| 4 | <i>inflata</i> Kutzng | 14 | 貧塩～鹽塩種 | 不定種 | 真正水種 |
| 5 | <i>linearis</i> | 1 | 貧塩～不定種 | 不定種 | 不定種 |
| 6 | <i>Amphora ovalis</i> Kutzng | 18 | 貧塩～小定種 | 好アルカリ種 | 不定種 |
| 7 | var <i>affinis</i> | 17 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ種 | 不定種 |
| 8 | <i>Caloneis silicula</i> Cleve | 43 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ種 | 不定種 |
| 9 | <i>Schroederi</i> Hest. | 12 | | | |
| 10 | <i>Cocconeis placenta</i> Ehr. | 24 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 11 | var <i>klinoraphis</i> Geitler | 13 | | | |
| 12 | <i>Cyclotella ocellata</i> Kutzngiana | 3 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 真正水種 |
| 13 | <i>stelligera</i> Cleve | 2 | 貧塩～不定種 | | 真正水種 |
| 14 | sp | 8 | | | |
| 15 | <i>Cymbella aequalis</i> Smith | 7 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 真正水種 |
| 16 | <i>affinis</i> | 41 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 17 | <i>aspera</i> | 103 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 18 | <i>cistula</i> Grun | 12 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 真正水種 |
| 19 | <i>cuspidata</i> Kutz | 10 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 20 | <i>cymbiformis</i> | 12 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 真正水種 |
| 21 | <i>Ehrenbergia</i> Kutz | 3 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 真正水種 |
| 22 | <i>helvetica</i> Kutz | 5 | | | |
| 23 | <i>lanceolata</i> Ehr. | 46 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 真正水種 |
| 24 | <i>parva</i> Cleve | 2 | | | |
| 25 | <i>tenuida</i> Heurck | 90 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 26 | <i>turgida</i> | 14 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 真正水種 |
| 27 | <i>turgidula</i> | 3 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 28 | <i>ventricosa</i> Kutz | 1 | 貧塩～不定種 | 不定 | 好流水 |
| 29 | <i>Cymatopleura solea</i> W.Smith | 1 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 30 | <i>Diatomina vulgaris</i> var <i>brevis</i> | 3 | | | |
| 31 | <i>Diploneis elliptica</i> Cleve | 1 | | | |
| 32 | <i>interrupta</i> Cleve | 2 | | | |
| 33 | <i>ovalis</i> Cleve | 29 | 貧塩～不定種 | 不定 | 不定種 |
| 34 | var <i>ovlongella</i> Cleve | 1 | | | |
| 35 | <i>Epithemia argus</i> Kutz | 5 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 真正水種 |
| 36 | <i>Hyndmanni</i> W.Smith | 2 | | | |
| 37 | <i>intermedia</i> Prickie | 2 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 真正水種 |
| 38 | <i>sorex</i> Kutz | 13 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 好流水 |
| 39 | <i>turgida</i> Kutz | 81 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 好流水 |
| 40 | var <i>granulata</i> Grun | 2 | | | |
| 41 | <i>zebra</i> Kutz | 9 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-----|--------|--------|------|
| 42 | var porcallus | 11 | | | |
| 43 | Eunotia arcus Ehr. | 15 | 貧塙～縁塙種 | 好 破 性 | 不定種 |
| 44 | diodon Eh | 3 | 貧塙～縁塙種 | 好 駿 性 | 不定種 |
| 45 | gracilis Gab. | 9 | 貧塙～縁塙種 | 好 嫩 性 | 不定種 |
| 46 | paludosa Grun. | 1 | | | |
| 47 | pectinalis Kutz | 14 | 貧塙～縁塙種 | 好 破 性 | 不定種 |
| 48 | var minor | 118 | 貧塙～縁塙種 | 好 駿 性 | 不定種 |
| 49 | var undulata | 99 | 貧塙～縁塙種 | 好 破 性 | 不定種 |
| 50 | var ventralis | 11 | 貧塙～縁塙種 | 好 破 性 | 不定種 |
| 51 | praerupta | 1 | 貧塙～縁塙種 | 好 駿 性 | 不定種 |
| 52 | var bidens | 17 | 貧塙～縁塙種 | 好 破 性 | 不定種 |
| 53 | sudetica | 1 | 貧塙～縁塙種 | 好 嫩 性 | 不定種 |
| 54 | var bidens | 4 | 貧塙～縁塙種 | 好 駿 性 | 不定種 |
| 55 | valida Hustedt | 23 | 貧塙～縁塙種 | 好 駿 性 | 不定種 |
| 56 | veneris O.Muller | 12 | 貧塙～不定種 | 不 定 | 不定種 |
| 57 | Fragilaria lapponica Grunow | 1 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 58 | Frusturia rhomboides Ehr. | 6 | 貧塙～縁塙種 | 好 駿 性 | 好止水種 |
| 59 | vulgaris | 6 | 貧塙～不定種 | 不 定 | 不定種 |
| 60 | Gomphonema acuminatum Ehr. | 5 | 貧塙～不定種 | 不 定 | 好止水種 |
| 61 | var coronata | 10 | 貧塙～不定種 | 不 定 | 好止水種 |
| 62 | var turris | 2 | 貧塙～不定種 | 不 定 | 好止水種 |
| 63 | var trigonocephala | 1 | | | |
| 64 | angustatum Rabh. | 4 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 65 | augur | 1 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 66 | breibissonii | 1 | | | |
| 67 | constrictum Ehr. | 4 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 68 | var turris | 3 | | | |
| 69 | gracile var lanceolata | 1 | | | |
| 70 | intricatum var pumila | 23 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | 好止水種 |
| 71 | longiceps var montana | 4 | | | |
| 72 | var subclavata | 17 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | ? |
| 73 | fo gracilis | 6 | | | |
| 74 | parvulum Kutz | 13 | 貧塙～不定種 | 不 定 | 不 定 |
| 75 | olivaceum Kutz | 2 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 76 | subclavatum | 22 | | | |
| 77 | truncatum | 2 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 78 | var turgidum | 1 | | | |
| 79 | Gyrosigma acuminatum | 23 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | 好流水 |
| 80 | hantzschia amphioxys Grun | 131 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | 不定種 |
| 81 | Hantzschia amphioxys fo capitata | 1 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ種 | 不定種 |
| 82 | elongata Grun | 17 | | | |
| 83 | Merosila granulata Ehr. | 17 | 貧塙～不定種 | 好アルカリ | 好止水種 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------|----|--------|--------|------|
| 84 | <i>islandica</i> O.Mull | 2 | | | |
| 85 | <i>italica</i> Kutz | 17 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 好水性 |
| 86 | <i>Meridion circulare</i> Agardh | 6 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ種 | 好流木種 |
| 87 | var <i>constricta</i> | 93 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ種 | 好流木種 |
| 88 | <i>Navicula bacillatum</i> Ehr. | 9 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ種 | 不定種 |
| 89 | var <i>Gregoryana</i> | 1 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ種 | 不定種 |
| 90 | <i>cuspidata</i> Kutz | 1 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ種 | 不定種 |
| 91 | <i>hasta</i> Pan. | 1 | 貧塩～不定種 | ? | 好水性 |
| 92 | <i>lanceolata</i> Kutz | 1 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 好水性 |
| 93 | <i>peregrina</i> Kutz | 2 | | | |
| 94 | <i>plecentula</i> Grun | 2 | 貧塩～不定種 | 不定種 | 不定種 |
| 95 | <i>pupula</i> Kutz | 5 | 貧塩～不定種 | 不定種 | 不定種 |
| 96 | var <i>rectangularis</i> | 1 | 貧塩～不定種 | 不定種 | 不定種 |
| 97 | <i>rakiosa</i> Kutz | 29 | 貧塩～不定種 | 不定種 | |
| 98 | <i>Neidium affin</i> Cleve | 4 | 貧塩～不定 | 不定種 | 真正水性 |
| 99 | <i>dubium</i> Cleve | 8 | 貧塩～不定 | 不定種 | 不定種 |
| 100 | var <i>constricta</i> | 4 | 貧塩～不定 | 不定種 | 不定種 |
| 101 | <i>iridis</i> Cleve | 7 | 貧塩～嫌塩種 | 不定種 | 真正水性 |
| 102 | fo <i>vernalis</i> | 26 | 貧塩～嫌塩種 | 不定種 | 真正水性 |
| 103 | <i>temporal</i> Reim. | 2 | | | |
| 104 | <i>Netzschia linearis</i> W.Smith | 12 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 好水性 |
| 105 | <i>cotusa</i> W.Smith | 1 | ? | 好アルカリ | 弱中塩 |
| 106 | <i>recta</i> Watzsch | 9 | | | |
| 107 | <i>Pinnularia acropphaeria</i> | 2 | 貧塩～嫌塩種 | 不定種 | 好水性 |
| 108 | <i>acuminatum</i> var <i>bielezwskii</i> | 61 | 貧塩～嫌塩種 | 不定種 | 好水性 |
| 109 | <i>borealis</i> Ehr. | 1 | 貧塩～不定種 | 不定 | 不定種 |
| 110 | Brauni var <i>amphicephala</i> | 4 | 貧塩～嫌塩種 | 好酸性 | ? |
| 111 | <i>brevicostata</i> Cleve | 26 | 貧塩～不定種 | 不定 | 不定種 |
| 112 | <i>divergens</i> W.Smith | 5 | 貧塩～不定種 | 好酸性 | 不定種 |
| 113 | var <i>elliptica</i> | 7 | 貧塩～不定種 | 好酸性 | 不定種 |
| 114 | <i>dactylus</i> Ehr. | 7 | 貧塩～不定種 | 好酸性 | 不定種 |
| 115 | <i>episcopalis</i> Cleve | 3 | | | |
| 116 | <i>esox</i> Ehr. | 25 | | | |
| 117 | <i>gentilis</i> Cleve | 2 | | | |
| 118 | <i>gibba</i> Ehr. | 71 | 貧塩～不定種 | 好酸性 | 不定種 |
| 119 | var. <i>linearis</i> | 21 | 貧塩～嫌塩種 | 好酸性 | 不定種 |
| 120 | fo <i>subundulata</i> | 15 | 貧塩～嫌塩種 | 好酸性 | 不定種 |
| 121 | <i>Pinnularia gibba</i> var. <i>parva</i> | 7 | 貧塩～不定種 | 好酸性 | 不定種 |
| 122 | <i>interrupta</i> fo <i>minutissima</i> | 3 | | | |
| 123 | <i>legumen</i> Ehr. | 6 | | | |
| 124 | <i>macilenta</i> Cleve | 11 | | | |
| 125 | <i>major</i> Kutz. | 28 | 貧塩～不定種 | 真酸性 | 好水性 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|
| 126 | <i>mesolepta</i> W.Smith. | 22 | 貧塩～不定種 | 不 定 | 不 定 種 |
| 127 | <i>fo angusta</i> Cleve | 13 | 貧塩～鐵塩種 | 不 定 | 不 定 種 |
| 128 | <i>microstauron</i> Cleve. | 22 | 貧塩～不定種 | 好 酸 性 | 不 定 種 |
| 129 | <i>nobilis</i> Ehr. | 4 | | | |
| 130 | <i>pureva</i> Cleve | 3 | | | |
| 131 | <i>stomatophora</i> Grunow | 1 | 貧塩～鐵塩種 | 好 酸 性 | 好止水種 |
| 132 | <i>subsolaris</i> Cleve. | 24 | | | |
| 133 | <i>viridis</i> Ehr. | 125 | 貧塩～不定種 | 不 定 | 不 定 種 |
| 134 | <i>var minor</i> | 9 | 貧塩～不定種 | 不 定 | 不 定 種 |
| 135 | <i>var. sudetica</i> | 81 | 貧塩～不定種 | 不 定 | 不 定 種 |
| 136 | <i>Peronia erinacea</i> | 6 | | | |
| 137 | <i>Rhopalodia gibba</i> O.Mull | 25 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不 定 種 |
| 138 | <i>gibberula</i> O.Mull | 25 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不 定 種 |
| 139 | <i>Stauroneis acuta</i> W.Smith | 15 | | | |
| 140 | <i>alabamae</i> Heiden | 2 | | | |
| 141 | <i>anceps</i> Ehr | 18 | 貧塩～不定種 | 不 定 | 不 定 種 |
| 142 | <i>phoenicapteron</i> Ehr | 55 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 好止水種 |
| 143 | <i>Stephanodiscus astraea</i> Grun | 2 | 貧塩～不定種 | 真アルカリ | 好止水種 |
| 144 | <i>carrenensis</i> Grun | 1 | | | |
| 145 | <i>Sorirella biserrata</i> | 2 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 真流水種 |
| 146 | <i>elegans</i> Ehr | 24 | | | |
| 147 | <i>linearis</i> var <i>constricta</i> | 4 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 好止水種 |
| 148 | <i>robusta</i> Ehr | 3 | 貧塩～鐵塩種 | 好アルカリ | 真止水種 |
| 149 | <i>tenua</i> W.Smith | 7 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | |
| 150 | <i>Synedra affinis</i> var <i>fasciculata</i> | 5 | | | |
| 151 | <i>ulna</i> Ehr. | 223 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | 不 定 種 |
| 152 | <i>var biceps</i> Kutz | 6 | 貧塩～不定種 | 好アルカリ | ? |
| 153 | <i>fo constricta</i> | 5 | | | |
| 154 | <i>var Ramesii</i> | 5 | | | |

第5表 石川条星遺跡付近の被覆フローラ

| No. | species name | 3 | 4-2 | 5 | 6-1 | 6-2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------------------|---|-----|---|-----|-----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Achmanthes brevipes var intermedia | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | | |
| 2 | inflata | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 3 | lanceolata var elliptica | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4 | Amphora ovalis Kutz | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | |
| 5 | var affinis | | | | | | 4 | 18 | 1 | 3 | 1 | | | | |
| 6 | Normani Rabh | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7 | Caloneis siliqua Cleve | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 8 | Coccinea placenta Ehr. | | | | | | 2 | 29 | 9 | 8 | 15 | 7 | | | |
| 9 | scutellum Ehr | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 10 | Cyclotella ocellata Kutz | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 11 | stelligera Cleve | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 12 | sp | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 13 | catenata Brun | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 14 | Cymbella affinis | | | | | | 1 | 1 | 2 | 7 | | | 1 | | |
| 15 | aspera | | | | | | 2 | 2 | | 4 | 2 | | 1 | | |
| 16 | cistula Grun | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 17 | var maculata | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 18 | cuspidata Kutz | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 19 | cymbiformis | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | 2 | |
| 20 | lanceolata Ehr. | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 21 | tumida Heurck | | | | | | 5 | 1 | | 6 | 4 | 1 | | 1 | |
| 22 | turgida | | | | | | | | 3 | 2 | | | | 1 | |
| 23 | ventricosa Kutz | | | | | | | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | |
| 24 | Diatoma vulgare Bory | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 25 | var brevis | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 26 | Diploneis elliptica Cleve | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 27 | interrupta Cleve | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 28 | ovalis Cleve | | | | | | 9 | 7 | | 1 | 5 | 2 | | 1 | |
| 29 | Epithemia argus Kutz | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 30 | var aipestris | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 31 | var longicornis | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | | |
| 32 | var protracta | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 33 | sorex Kutz | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 34 | var gracilis | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 35 | turigida Kutz | | | | | | | 4 | 1 | | 7 | 16 | 3 | 4 | 8 |
| 36 | zebra var minor | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 37 | var porcellus | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 38 | var soxonica | | | | | | | | | | | 2 | | | 11 |
| 39 | Eunotia arcus Ehr. | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | |
| 40 | var bidens | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 41 | Eunotia diodon Ehr. | | | | | | | | | | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 42 | pectinellis var minor | | | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 43 | fo impressas | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 44 | var undulata | | | 18 | 2 | 2 | | 9 | 15 | 1 | |
| 45 | var ventralis | | | | 4 | 2 | | 3 | | 3 | |
| 46 | praerupta var bidens | | | 1 | | | 1 | 7 | | | |
| 47 | var inflata | | | | 3 | | | | | | |
| 48 | sudetica | | | | | | | | 3 | | |
| 49 | var bidens | | | | | 1 | 5 | 9 | 12 | | |
| 50 | valida Hustedt | | | 8 | 3 | | | 2 | 5 | | |
| 51 | Fragilaria pinnata Ehr | | | | | 3 | 6 | | | | |
| 52 | Frustularia vulgaris | | | 3 | | | | | | | |
| 53 | Gomphonema acuminatum Ehr. | | | | | | | 2 | | | |
| 54 | var Brebissonii | | | | | | | 3 | | 1 | 1 |
| 55 | var coronata | | | | 1 | | | | | | |
| 56 | var tauria | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 57 | augur | | | | | | | 1 | | | |
| 58 | bohemicum | | | | | | 11 | | | | |
| 59 | constrictum var capitata | | | | 9 | 1 | | | | | |
| 60 | gracile Ehr | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 61 | var lanceolata | | | | 21 | 4 | 32 | 6 | | | |
| 62 | intricatum var pumila | | | | | 4 | 11 | | | | |
| 63 | longiceps var subclavata | | | 1 | | 1 | 2 | 10 | | | |
| 64 | tauria | | | | | | 1 | | | | |
| 65 | sp | | | | 2 | 2 | 3 | | | | |
| 66 | Hantzschia amphioxys Grun | | | 15 | 20 | 15 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | var vivax | | | | 1 | | | | | | |
| 68 | Melosira granulata Ehr | | | | | | | | 5 | | 1 |
| 69 | Italica Kutz | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 |
| 70 | Italica subspec subarctica | | | | | | | | 2 | | |
| 71 | Meridion circulata var constricta | | | 6 | 13 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 72 | Navicula americana Ehr | | | | | | | | 1 | | |
| 73 | cuspidata Kutz | | | | 1 | | | | | | |
| 74 | lanceolata Kutz | | | | | | | 1 | | | |
| 75 | pupula var capitata | | | | | 1 | | | | | |
| 76 | radiosa Kutz | | | | 1 | | | | 5 | | |
| 77 | Reinhardti | | | | | 1 | 1 | | 4 | 4 | |
| 78 | Neldium iridis Cleve | | | | | 6 | | 1 | | | |
| 79 | var amphigomphus | | | | | 1 | | | | | |
| 80 | Nitzschia commutata Grun | | | | 4 | | | | | | |
| 81 | Nitzschia stagonorm Rabb | | | | | 6 | | | | | |
| 82 | thermals Kutz | | | | | | 1 | | | | |
| 83 | vivax W. Smith | | | | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 84 | Pinnu. acuminatum var. bielawskii | | | 7 | 14 | | 1 | | 1 |
| 85 | Brauni var. amphicephala | | | | | | | | 1 |
| 86 | brevicostata Cleve | | | | | 3 | | 2 | 2 |
| 87 | divergens var. undulata | | | | | 3 | | | |
| 88 | globa Ehr. | | | 2 | 9 | | 1 | 1 | |
| 89 | var. linearis | | | 7 | 13 | | | 2 | 1 |
| 90 | globa var. parva | | | | 1 | | | | |
| 91 | interrupta | | | | | 1 | | | |
| 92 | macilenta Cleve | | | | | | | | 1 |
| 93 | major Kutz. | | | 2 | 4 | | | | |
| 94 | mesolepta W. Smith | | | 1 | 2 | | 4 | | |
| 95 | microstauron Cleve | | | 2 | 28 | 4 | | 3 | |
| 96 | var. Brebissonii | | | | | | | | 1 |
| 97 | pulchra | | | | 17 | | | | |
| 98 | subsoavis Cleve | | | 1 | 9 | | | | 1 |
| 99 | viridis Ehr. | | | 3 | 5 | | 3 | 5 | 1 |
| 100 | var. commutata | | | 10 | | | | | |
| 101 | var. sudeica | | | 3 | 16 | | | | 1 |
| 102 | Rhoicaphenia curvata | | | | | | 1 | 3 | |
| 103 | Rhopalodia gibba | | | | | | | 1 | 1 |
| 104 | gibberula O. Mull | | | | 1 | 2 | | 4 | |
| 105 | Stauroneis anceps f. gracilis | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 106 | phoenicenteron Ehr | | | 3 | | | | 5 | 1 |
| 107 | Stephanodiscus sp | | | | | 2 | | | 1 |
| 108 | Synedra affinis var. fasciculata | | | 11 | | | | | |
| 109 | ulna Ehr. | | | 7 | 19 | 6 | 2 | 11 | 5 |
| 110 | var. impressa | | | | 3 | | 10 | 3 | |
| 111 | var. Ramesi | | | | | | | | 7 |
| 112 | Vancherieae | | | | | | 2 | 2 | |
| 合計 | | | | 158 | 290 | 93 | 111 | 206 | 163 |
| | | | | | | | | 35 | 27 |
| | | | | | | | | | 52 |

第6表 石川県里遺跡Ⅱ区の珪藻の生態性

| No. | species name | 合計 | 塩分濃度 | pH | 流水 |
|-----|------------------------------------|----|-------|-------|-----|
| 1 | Achnanthes brevipes var intermedia | | | | |
| 2 | infesta | | 貧塩～鹽塩 | 不定 | 真止水 |
| 3 | lanceolata var elliptica | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 4 | Amphora ovalis Kutz | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 5 | var affinis | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 6 | Normani Rabh | | | | |
| 7 | Caloneis silicula Cleve | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 8 | Cocconeis plicatula Ehr | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 9 | scutellum Ehr | | | | |
| 10 | Cyclorella ocellata Kotzingiana | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 真止水 |
| 11 | stelligera Cleve | | 貧塩～不定 | | 真止水 |
| 12 | sp | | | | |
| 13 | catenata Brun | | | | |
| 14 | Cymbella affinis | | 貧塩～不定 | 真アルカリ | 好止水 |
| 15 | aspera | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 16 | ciliata Grun | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 真止水 |
| 17 | var maculata | | | | |
| 18 | cuspidata Kutz | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 19 | Cymbiformis | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 真止水 |
| 20 | lanceolata Ehr. | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 真止水 |
| 21 | tumida Heurck | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 22 | turgida | | 貧塩～不定 | 真アルカリ | 真止水 |
| 23 | ventricosa Kutz | | 貧塩～不定 | 不定 | 好流水 |
| 24 | Diatoma volgare Bory | | | | |
| 25 | var brevis | | | | |
| 26 | Diploneis elliptica Cleve | | | | |
| 27 | interrupta Cleve | | | | |
| 28 | ovalis Cleve | | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 29 | Epithemia argus Kutz | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 好止水 |
| 30 | var alpestris | | | | |
| 31 | var longicornis | | | | |
| 32 | var protracta | | | | |
| 33 | sorex Kutz | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | |
| 34 | var gracilis | | | | |
| 35 | turgida Kutz | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 好止水 |
| 36 | zebra var minor | | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 37 | var porcelius | | | | |
| 38 | var soxonica | | | | |
| 39 | Eunotia arcus Ehr. | | 貧塩～鹽塩 | 好酸性 | 不定 |
| 40 | var bidens | | 貧塩～鈉塩 | 好酸性 | 不定 |
| 41 | Eunotia diodon Ehr | | 貧塩～鈉塩 | 好酸性 | 不定 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 42 | <i>peccinalis</i> var <i>minor</i> | 貧塩～鰐塩 | 好酸性 | 不定 |
| 43 | <i>fo impressa</i> | 貧塩～鰐塩 | 好酸性 | 不定 |
| 44 | <i>var undulata</i> | 貧塩～鰐塩 | 好酸性 | 不定 |
| 45 | <i>var ventralis</i> | 貧塩～鰐塩 | 好酸性 | 不定 |
| 46 | <i>praerupta</i> var <i>bidens</i> | 貧塩～鰐塩 | 好酸性 | 不定 |
| 47 | <i>var inflata</i> | 貧塩～鰐塩 | 好酸性 | 不定 |
| 48 | <i>gudieica</i> | 貧塩～鰐塩 | 好酸性 | 不定 |
| 49 | <i>var. bidens</i> | | | |
| 50 | <i>valida</i> Hustedt | 貧塩～鰐塩 | 好酸性 | - |
| 51 | <i>Fragilaria planata</i> Ehr | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 52 | <i>Frustaria vulgaris</i> | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 53 | <i>Gomphonema acuminatum</i> Ehr. | 貧塩～不定 | 不定 | 好止水 |
| 54 | <i>var Brebissonii</i> | | | |
| 55 | <i>var coronata</i> | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 56 | <i>var turris</i> | 貧塩～不定 | 不定 | 好止水 |
| 57 | <i>augur</i> | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 58 | <i>bohemicum</i> | | | |
| 59 | <i>constrictum</i> var <i>capitata</i> | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 60 | <i>gracile</i> Ehr | 貧塩～不定 | 不定 | 好止水 |
| 61 | <i>var lanceolata</i> | | | |
| 62 | <i>intricatum</i> var <i>pumila</i> | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 好止水 |
| 63 | <i>longiceps</i> var <i>subclavata</i> | 貧塩～不定 | 好アルカリ | |
| 64 | <i>turris</i> | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 65 | sp | | | |
| 66 | <i>Hantzschia amphioxys</i> Grun | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 67 | <i>var vivax</i> | | | |
| 68 | <i>Melosira granulata</i> Ehr | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 好止水 |
| 69 | <i>italica</i> Kutz | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 70 | <i>italica</i> subspec <i>sobactrica</i> | | | |
| 71 | <i>Meridion circulata</i> var <i>constrict</i> | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 真流水 |
| 72 | <i>Navicula americana</i> Ehr | | | |
| 73 | <i>cuspidata</i> Kutz | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 74 | <i>lanceolata</i> Kutz | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 75 | <i>papula</i> var <i>capitata</i> | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 76 | <i>radiosa</i> Kutz | 貧塩～不定 | 不定 | 不定 |
| 77 | <i>Reinhardtii</i> | 貧塩～不定 | 好アルカリ | 不定 |
| 78 | <i>Neidium iridis</i> Cleve | 貧塩～鰐塩 | 不定 | 好止水 |
| 79 | <i>var amphigonophus</i> | 貧塩～鰐塩 | 好アルカリ | 好止水 |
| 80 | <i>Nitzschia commutata</i> Grun | | | |
| 81 | <i>Nitzschia stagnorum</i> Rabn | | | |
| 82 | <i>thermalis</i> Kutz | | | |
| 83 | <i>vivax</i> W. Smith | | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 84 | <i>Pinnularia acuminatum</i> var. <i>bielawskii</i> | 貧塙～嫌塙 | 不 定 | 好 止 水 |
| 85 | <i>Braunii</i> var. <i>amphicephala</i> | 貧塙～嫌塙 | 好 酸 性 | |
| 86 | <i>brevicostata</i> Cleve | 貧塙～不定 | 不 定 | 不 定 |
| 87 | <i>divergens</i> var. <i>undulata</i> | 貧塙～嫌塙 | 好 酸 性 | |
| 88 | <i>gibba</i> Ehr. | 貧塙～不定 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 89 | var. <i>linearis</i> | 貧塙～嫌塙 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 90 | <i>gibba</i> var. <i>parva</i> | 貧塙～嫌塙 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 91 | <i>interrupta</i> | | | |
| 92 | <i>macilenta</i> Cleve | | | |
| 93 | <i>major</i> Kutz. | 貧塙～不定 | 好 酸 性 | |
| 94 | <i>mesolepta</i> W.Smith | 貧塙～不定 | 不 定 | 不 定 |
| 95 | <i>microstauron</i> Cleve | 貧塙～不定 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 96 | var. <i>Brebissonii</i> | 貧塙～不定 | 好 酸 性 | 不 定 |
| 97 | <i>pelegrina</i> | | | |
| 98 | <i>subsolaria</i> Cleve | | | |
| 99 | <i>viridis</i> Ehr. | 貧塙～不定 | 不 定 | 不 定 |
| 100 | var. <i>commutata</i> | | | |
| 101 | var. <i>sudetica</i> | 貧塙～不定 | 不 定 | 不 定 |
| 102 | <i>Rhoicosphenis curvata</i> | 貧塙～好塙 | 好 アルカリ | 不 定 |
| 103 | <i>Rhopalodia gibba</i> | 貧塙～不定 | 好 アルカリ | 不 定 |
| 104 | <i>gibberula</i> O.Mull | 貧塙～好塙 | 好 アルカリ | 不 定 |
| 105 | <i>Stauroneis anceps</i> fo. <i>gracilia</i> | 貧塙～不定 | 不 定 | 不 定 |
| 106 | <i>phoeniconteron</i> Ehr | 貧塙～不定 | 不 定 | 不 定 |
| 107 | <i>Steohanodiscus</i> sp | | | |
| 108 | <i>Synedra affinis</i> var. <i>fasciculata</i> | | | |
| 109 | <i>ulna</i> Ehr. | 貧塙～不定 | 好 アルカリ | 不 定 |
| 110 | var. <i>impressa</i> | | | |
| 111 | var. <i>Ramesii</i> | | | |
| 112 | <i>Vancheriae</i> | | | |

|—i

—

H

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

M
i
§


22

§ E


6 — 2
5 — 1
6 —
6
15
15

|
|
|


H




图版 1 石川条虫遗迹化石群集



图版2 石川条呈遗迹化石群集



図版3 石川条里遺跡化石群集



図版4 石川条里遺跡化石群集

長野県埋蔵文化財センター紀要3 1989

発行日 平成2年3月20日

編集発行 (財)長野県埋蔵文化財センター

〒388 長野市篠ノ井布施高田字篠963-4

TEL (0262) 93-5926

申 請 信 每書簿印刷株式会社

〒381 長野市西和田470

TEL (0262) 43-2105





2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

2012-2014

2015-2017

2018-2020

2021-2023

2024-2026

2027-2029

2030-2032

2033-2035

2036-2038

2039-2041

2042-2044

2045-2047

2048-2050

2051-2053

2054-2056

2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

2012-2014

2015-2017

2018-2020

2021-2023

2024-2026

2027-2029

2030-2032

2033-2035

2036-2038

2039-2041

2042-2044

2045-2047

2048-2050

2051-2053

2054-2056